



natagora

Les Punaises Pentatomoïdes au sein des réserves Natagora

Rapport de l'inventaire 2024



VANDAUDENARD Thibaud

BALTUS Hubert

Département Conservation

Juillet 2025

LES PUNAISES PENTATOMOÏDES AU SEIN DES RESERVES NATAGORA

RAPPORT DE L'INVENTAIRE 2024

NATAGORA : Département Conservation

Traverse des Muses 1 | 5000 Namur

www.natagora.be

info@natagora.be

Contact :

suivi.biologique.rn@natagora.be

Financement :

Ce rapport a été réalisé avec le soutien à l'emploi dans le secteur de la recherche par la Politique Scientifique Fédérale (www.belspo.be).

Photos de couverture :

Aélie commune (*Aelia acuminata*), ©Thibaud Vandaudenard

Rédaction et mise en page :

Thibaud Vandaudenard et Hubert Baltus

Citation recommandée :

VANDAUDENARD T. & BALTUS H., 2025. LES PUNAISES PENTATOMOÏDES AU SEIN DES RESERVES NATAGORA, Rapport de l'inventaire 2024 Natagora, Département Conservation, 90 pp.



Présente dans tout l'espace Wallonie-Bruxelles, Natagora possède de nombreuses réserves naturelles, réparties sur 6 200 hectares. Le grand objectif de l'association est d'enrayer la dégradation de la biodiversité et de contribuer au rétablissement d'un meilleur équilibre entre activités humaines et protection de l'environnement.

Aanwezig in de hele Federatie Wallonië-Brussel, Natagora beschikt over talrijke natuurgebieden, verspreid over 6 200 ha. Het groot doel van de vereniging is de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen en tot het herstel van een beter evenwicht tussen de mens en de natuur bij te dragen.



Suivi biologique des réserves naturelles Natagora

Inventaires des punaises pentatomoïdes – 2024



Suivi biologique des réserves naturelles Natagora
Inventaires des punaises pentatomoïdes – 2024

RÉSUMÉ

En 2024, un projet d'inventaire des punaises pentatomoïdes (Heteroptera : Pentatomoidea) a été lancé dans le but d'améliorer les connaissances sur cette super-famille d'insectes et de mieux comprendre la répartition de ces espèces au sein du réseau de réserves naturelles Natagora. Pas moins de 122 volontaires se sont inscrits à ce projet, couvrant 135 réserves naturelles différentes. Ce rapport analyse les données récoltées au cours de cette campagne et inclut, pour chaque espèce observée, une carte de répartition dans le réseau ainsi que des informations sur sa biologie et son écologie.

SAMENVATTING

In 2024 werd een inventarisatieproject van de pentatomide wantsen (Heteroptera: Pentatomoidea) gelanceerd, met als doel de kennis over deze superfamilie te verbeteren en hun verspreiding binnen het netwerk van natuurreervaten van Natagora beter te begrijpen. Maar liefst 122 vrijwilligers schreven zich in voor dit project, dat 135 verschillende natuurreervaten omvatte. Dit rapport analyseert de gegevens die tijdens deze campagne werden verzameld en bevat voor elke waargenomen soort een verspreidingskaart binnen het netwerk, evenals informatie over de biologie en ecologie ervan.

ZUSAMMENFASSUNG

Im Jahr 2024 wurde ein Erfassungsprojekt für Baumwanzen der Überfamilie Pentatomoidea (Heteroptera: Pentatomoidea) gestartet, mit dem Ziel, das Wissen über diese Insektengruppe zu erweitern und ihre Verbreitung im Natagora-Netzwerk von Naturschutzgebieten besser zu verstehen. Nicht weniger als 122 Freiwillige nahmen an diesem Projekt teil und untersuchten 135 verschiedene Naturschutzgebiete. Dieser Bericht analysiert die während der Kampagne gesammelten Daten und enthält für jede nachgewiesene Art eine Verbreitungskarte innerhalb des Netzwerks sowie Informationen zu ihrer Biologie und Ökologie.



Suivi biologique des réserves naturelles Natagora

Inventaires des punaises pentatomoïdes – 2024

CONTEXTE

Début 2017, un programme de suivi biologique des Réserves Naturelles Natagora a été mis en place. Ses objectifs principaux sont :

- *L'amélioration des connaissances en matière de diversité biologique des réserves tant par la prospection de réserves récemment créées ou peu fréquentées que par la mise à jour régulière des données historiques et anciennes ;*
- *L'analyse des données collectées en vue de définir le statut des espèces présentes et la tendance suivie par l'évolution des populations concernées ;*
- *L'amélioration continue de la gestion appliquée aux habitats semi-naturels présents dans les réserves afin qu'elle s'adapte au mieux et en priorité aux exigences écologiques des communautés d'êtres vivants à préserver.*

Ce suivi repose fortement sur l'expertise du réseau des naturalistes professionnels et surtout bénévoles de l'association ainsi que sur les bases de données des 3 portails d'encodage de données naturalistes principaux existant en Wallonie : Observations.be (Natagora), OFFH (SPW-DGO3-DEMNA) et iNaturalist. La plupart des données utilisées sont issues d'observations dites ponctuelles dont l'encodage fut largement encouragé par la création des bases de données en ligne de l'OFFH et d'observations.be et, plus récemment, par les applications pour smartphone Obsmapp et Obsidentify.

En 2024, le réseau des Réserves Naturelles Natagora couvrait **6252 ha** répartis en **265** sites distribués dans les 5 régions naturelles de Wallonie et de Bruxelles.

Tableau 1 : Répartition du nombre et de la surface des Réserves Naturelles Natagora selon les différentes régions naturelles de Wallonie et Bruxelles (situation en 2025).

Écorégion	Nombre de réserves	Surface (ha)
Nord Sillon Sambre et Meuse	58	1215
Condroz	31	886
Fagne-Famenne	63	1206
Ardenne	91	2458
Lorraine	22	487
Total	265	6252

Ces sites hébergent un certain nombre des habitats et des espèces d'intérêt patrimonial présents en Wallonie. La protection de ces habitats et espèces sur le long terme dans ces réserves est donc un objectif prioritaire que Natagora tente d'atteindre quotidiennement via la mise en œuvre d'actions de gestion, de protection et de sensibilisation au sein des sites concernés.

L'inventaire des punaises Pentatomoïdes réalisé en 2024 visait une amélioration des connaissances sur ce groupe taxonomique au sein des réserves naturelles de Natagora. Ceci afin de mieux comprendre leur répartition et leur présence dans le réseau.

Le présent rapport présente les résultats de l'analyse des observations de punaises Pentatomoïdes réalisées en 2024. Il permet la visualisation des résultats des inventaires, propose des mesures de gestion pour favoriser ce groupe et présente chaque espèce et sa répartition dans le réseau.



DESCRIPTION DE L'INVENTAIRE

Les recensements avaient pour objectif principal d'améliorer nos connaissances générales sur les Hétéroptères et particulièrement au sein de la super-famille des Pentatomoïdes dans le réseau de réserves naturelles. Ceci a pu être réalisé via des recherches ciblées en particulier dans des sites déficitaires en données récentes et ceci grâce à l'aide des nombreux volontaires motivés. Ces volontaires pouvaient sélectionner jusqu'à 3 réserves dans lesquels il leur était demandé de faire un minimum de 3 passages d'inventaires entre les mois d'avril et d'octobre.

Lors de ces passages, 3 techniques d'inventaire ont pu être utilisées pour trouver ces punaises : la recherche à vue sur les plantes hôtes, la capture au filet fauchoir et le battage de branches à l'aide d'un parapluie japonais. Tous les individus trouvés grâce à l'une de ces 3 techniques ont été photographiés le plus précisément possible sur le terrain et encodés dans Observations.be avec ou sans détermination précise. Chaque individu capturé était maintenu en vie et relâché immédiatement sur son endroit de capture après la prise des photos. Les observations encodées, ont été pour la plupart vérifiées et validées.

Pour ces inventaires les volontaires étaient couverts par une dérogation de capture leur permettant de se déplacer dans les sites protégés, d'observer ces punaises pentatomoïdes et les capturer momentanément.



Figure 1 : Inventaires dans la réserve Naturelle de Dailly lors d'une journée de formation à la recherche des punaises pentatomoïdes, photo Thibaud Vandaudenard.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 2024

En 2024, les conditions météorologiques ont été particulièrement atypiques. L'année a été marquée par des températures exceptionnellement élevées, un ensoleillement très déficitaire, et des précipitations exceptionnellement excédentaires en quantité, bien que leur fréquence soit restée dans les normes. Avec un cumul annuel de 1170,7 mm, 2024 devient l'année la plus pluvieuse depuis le début des relevés en 1833, dépassant largement le précédent record de 2001. Cette pluviométrie remarquable s'est concentrée sur un nombre inhabituellement élevé de jours très pluvieux (> 20 mm), au nombre de 11. Malgré une insolation réduite, les températures sont restées globalement élevées, avec des anomalies positives marquées notamment en février.

Pour les punaises pentatomoïdes, l'année 2024 pourrait avoir eu des effets contrastés. Les espèces thermophiles et strictement diurnes, souvent actives en milieux ouverts et ensoleillés, ont probablement vu leur activité et leur reproduction réduites, du fait du manque de chaleur directe et du rayonnement solaire. À l'inverse, certaines espèces phytophages liées aux milieux frais ou humides, ainsi que les espèces forestières ou de lisières, ont pu bénéficier d'une végétation plus dense et productive.

Ces conditions ont toutefois nettement affecté l'activité naturaliste ainsi que la dynamique des espèces. L'humidité persistante au cours du printemps et la faible luminosité ont perturbé la planification des sorties et limité les observations.

Données météorologiques synthétisées du site météo.be.



Suivi biologique des réserves naturelles Natagora

Inventaires des punaises pentatomoïdes – 2024

RÉSULTATS DE L'INVENTAIRE

SOURCES ET QUANTIFICATION DES DONNÉES

Au total, ce ne sont pas moins de 122 personnes qui se sont inscrites pour participer au projet d'inventaires, couvrant de la sorte 135 réserves naturelles. Qu'ils en soient vivement remerciés !

Andrin Muriel, Atruy Térance, Baltus Hubert, Baudoux Tom, Berquin Emmanuelle, Bonhomme Xavier, Carlier Yves, Clarinval Françoise, Cowez Lison, D'auvrin Thierry, D'Hulstère Dany, Dal Farra Philippe, De Keyser Nathalie, De Potter - Wolfs Anne, Deflorenne Philippe, Degossely Philippe, Delangh Denis, Delhaise Caroline, Deltrenne Mélanie, Deschamps Gauthier, Detiffe Nicolas, de Vinck Cédric, Devondel Martine, de Vries Presilia, Dewerchin Marianne, Dideren Isabelle, Dubucq Mireille, Dufourny Hugues, Farinelle Charly, Fivet Adeline, Fontaine Cédric, Foucart Arnaud, Gailly Damien, Gautier Véronique, Gelbgras Florence, Gélon Maryse, Gillard Michel, Gillebert Karl, Gillet Mathieu, Giraudo Federico, Godding Elisabeth, Goffin Adrien, Goffin Eric, Goffinet Catherine, Gonze Maxime, Goris Daniel, Gosselin Matthias, Guffens Gisèle, Guérin Léopold, Guyaux Frédéric, Guyot Léopold, Hendrickx Peter, Huberland Jean-Marc, Huysecom Joelle, Ittelet Michel, Johnen Jerome, Joissains Eddie, Kyriakidis Stéfane, Labranche Augustin, Laine Emmanuelle, Lambert Anne, Lambert Robert, Lange Christian, Lange Thomas, Lassman Milan, Leclercq Elliott, Lefin Jean-Philippe, Lepage Martin, Lepoutre Guy, Lighezzolo Patrick, Locht Alain, Maniquet Thierry, Marchi Armando, Matala Ardrian, Mathieu Annie, Mayaux Violette, Mees Michael, Meulebrouk Yves, Moniotte Philippe, Moonen Daniel, Moreels Claude, Nageon de Lestang Christelle, Noël Pascal, Paquet Alain, Picard Nathalie, Pierret Dominique, Pirson Stéphane, Pittoors Sophie, Poiret Elise, Poiret Hubert, Poncin Jacky, Powis Serge, Querton Gilbert, Raes Frédéric, Raucq Serge, Richel Thierry, Rigo Maxime, Roger Guillaume, Rotonda Mathys, Rubio Maxime, San Martin Gilles, Schretter Bernard, Scieur Nora, Sevrin Damien, Stasse Nora, Stroot Philippe, Taviaux Nathalie, Taymans Julien, Thunus Olivier, Tonnelle Jean-Benoit, Vanmeerbeek Philippe, Vandaudenard Thibaud, Valdueza Garrido Manuel, Verdoodt Jean-Claude, Wagner Florence, Wagnon Maxence, Walsdorff Thomas, Wargé Laurent, Wéber Roland, Widuch Grazyna.

Toutes les données naturalistes encodées dans OFFH, Observations.be et INaturalist (à l'exception de celles qui ne peuvent être cédées à des institutions scientifiques ou des tiers) ont été exploitées dans le cadre de ce rapport. Elles ont été exportées des 3 systèmes en avril 2025. Les observations réalisées dans et à proximité immédiate (dans un rayon de 30 mètres) des réserves ont été sélectionnées. Seules les observations certaines et non rejetées par la validation ont été utilisées dans l'analyse. Au total, **89,6 %** des données sélectionnées étaient validées.

Au total ce ne sont pas moins de **7687** données de punaises pentatomoïdes qui ont été récoltées dans le réseau de réserves dont **2534** en 2024. Le lancement des recensements en 2024 a fortement augmenté le nombre de données pour ce groupe taxonomique au sein du réseau de réserves comme illustré dans la figure 1 ci-dessous.




Figure 2 : Nombre de données et d'espèces encodées par année dans le réseau de réserves.



Suivi biologique des réserves naturelles Natagora

Inventaires des punaises pentatomoïdes – 2024

DIVERSITÉ EN PUNAISES PENTATOMOÏDES AU SEIN DU RÉSEAU DES RÉSERVES NATURELLES NATAGORA

Sur les 263 réserves du réseau, **87 %** d'entre elles sont couvertes par au moins une observation de punaises pentatomoïdes. L'effort de recherche n'est toutefois pas homogène avec certaines régions bien plus visitées et d'autres rarement prospectées. Comme le montre la carte du nombre d'observations de ces punaises dans les réserves (figure 3).




Figure 3 : Carte du nombre d'observations de pentatomoïdes dans les réserves. Résultats groupés par carrés de 5 Km.




Figure 4 : Carte du nombre d'observations de pentatomoïdes dans les réserves. Résultats groupés par carrés de 5 Km.

Mis à part les quelques carrés avec plus de 200 observations dans quelques réserves très connues et visitées (Sclaigheaux, Harchies, Montagne Saint-Pierre, Devant-Bouvignes, Virelles), une partie du réseau pourrait encore bénéficier d'une recherche plus approfondie.

Notamment l'Ardenne, dans laquelle une surface importante de réserves naturelles Natagora sont situées, n'enregistre que peu d'observations. Ceci est notamment lié au fait qu'il s'agit parfois de réserves moins connues, plus isolées et parfois difficilement accessibles. Ceci n'est toutefois pas signe de réserves moins intéressantes au niveau diversité.

L'effort de prospection est souvent assez bien corrélé avec la diversité spécifique d'un site, comme il est possible de le voir en comparant la figure 3 à la figure 4 ci-contre. Plus on cherche plus on trouve jusqu'à atteindre un plateau différent pour chaque réserve et dépendant principalement des habitats/micro-habitats et des espèces végétales présentes.

Certaines réserves bien connues du public et avec des habitats diversifiés peuvent alors abriter un grand nombre d'espèces. Les deux réserves naturelles avec le plus d'espèces sont

respectivement Sclaigheaux avec 34 espèces et Devant-Bouvignes avec 33. Ce qui représente plus de la moitié des 56 espèces présentes dans le réseau de réserves.

LES DÉCOUVERTES REMARQUABLES EN 2024

En 2024, 47 espèces de punaises pentatomoïdes ont été observées dans le réseau de réserves. La saison d'inventaires de 2024 a permis d'augmenter la liste d'espèces de 130 réserves différentes avec pour 16 d'entre elles plus de 5 espèces ajoutées à leur total et deux d'entre elles plus de 10 espèces (Lahage avec 12 nouvelles espèces et le Bois de Wadergnies avec 11 nouvelles espèces).

Sur les 57 espèces observées dans le réseau de réserves, un peu plus de **82 %** (47 espèces) ont été observées durant la saison d'inventaire. Au total basé sur le niveau de rareté des espèces d'observations.be, 19 espèces rares ou très rares ont été observées dans les réserves durant la période d'inventaires. Les espèces très rares observées durant les inventaires sont reprises ci-dessous (table 3).

Tableau 2 : Espèces très rares observées lors de la saison d'inventaires dans les réserves

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Réserves 2024
<i>Adomerus biguttatus</i>	Séhire baponctué	Thier à la Tombe
<i>Coptosoma scutellatum</i>	Coptosome globuleuse	Carrière d'Evieux, Derrière Vesin, Les Briqueteries de Rome, Sclaigneaux, Waulsort
<i>Elasmotethus minor</i>	Acanthosome des camérisiers	Beaulieu, Devant-Bouvignes, Sclaigneaux
<i>Eurygaster austriaca</i>	Eurygastre caréné	Devant-Bouvignes, Marcasse et alentours, Ochamps
<i>Eurygaster maura</i>	Eurygastre des friches	Behotte, Devant-Bouvignes, Les Briqueteries de Rome, Les Spinets, Sclaigneaux, Thier à la Tombe
<i>Holcostethus sphacelatus</i>	Péribale des molènes	Carrière d'Evieux
<i>Legnotus picipes</i>	Légnote à pattes noires	Lahage, Mont des Pins
<i>Neottiglossa leporina</i>	Néottiglosse des prés	Heinsch
<i>Rhacognathus punctatus</i>	Asope ponctué	Ry de Bêve
<i>Sciocoris homalonotus</i>	Grand Sciocore	Espace Tilou, Thier de Boirs
<i>Stagonomus bipunctatus</i>	Stagonome nain	Lahage
<i>Tritomegas sexmaculatus</i>	Tritomège des marrubes	Harchies, Montagne Saint-Pierre

Dans ces 12 espèces très rares observées en 2024 dans les réserves, l'une d'entre elle, le **séhire baponctué** (*Adomerus biguttatus*), n'avait encore jamais été observé dans le réseau de réserves. Cette découverte a été réalisée en novembre dans la réserve du Thier à la Tombe. Cette espèce très rare en Belgique bien que répandue à travers le pays se nourrit principalement de mélampyre des prés. Elle était déjà connue de la partie RND de la Montagne Saint-Pierre à proximité.

Parmi les 57 espèces observées en réserves, certaines n'avait plus été observées depuis quelques années dans le réseau, et ont été observées en 2024 dans de nouvelles réserves. C'est le cas de la **légnote à pattes noires** (*Legnotus picipes*) observée uniquement 3 fois en réserves et plus observé depuis 2020 qui a été rajoutée à la liste de 2 réserves en 2024 : Lahage et le Mont des Pins. Le **stagonome nain** (*Stagonomus bipunctatus*) avec seulement 4 observations dans 4 réserves différentes jusqu'en 2024 a été également ajouté à la réserve de Lahage.



Figure 5 : *Adomerus biguttatus* (à gauche) au Thier à la Tombe, photo : Warre Van Caenegem et *Legnotus picipes* (à droite) au Mont des Pins, photo : Axel Gosseries.

RECOMMANDATIONS DE GESTION POUR FAVORISER LES PUNAISES PENTATOMOÏDES

Les paragraphes ci-dessous présentent des mesures générales favorables à une diversité d'espèces punaises pentatomoïdes. Ceux-ci sont généraux et ne servent pas de guide de gestion spécifique à l'une ou l'autre espèce (pour ceci, il faudra se baser sur les fiches espèces et les informations sur leur écologie et plantes hôtes).

1. Préserver et entretenir une mosaïque d'habitats naturels variés

- o **Milieux ouverts et semi-ouverts** : prairies fleuries, pelouses sèches, landes, friches, clairières, ourlets.
- o **Milieux boisés et arborés** : haies, lisières, bosquets, forêts claires et mixtes, y compris boisements à bouleaux, aulnes, noisetiers, chênes, genévriers.
- o **Zones humides et de transition** : marais, tourbières, aulnaies, cariçaies, bords de cours d'eau.

2. Promouvoir une gestion extensive et différenciée des milieux

- o Fauche **tardive** (été-automne) sur une partie des prairies et bords de chemins.
- o Éviter le **surpâturage** et le broyage systématique.
- o Laisser des zones peu ou pas entretenues (refuges pour les espèces spécialisées).

3. Maintenir et favoriser une flore diversifiée

- o Conserver ou restaurer la diversité des **graminées, labiées, ombellifères, crucifères, légumineuses, rosacées**, etc.
- o Préserver les **plantes hôtes spécifiques** (genévriers, bouleaux, aubépines, gaillets, cytises...).

4. Limiter les impacts de l'agriculture intensive

- o Limiter l'arrivée d'**intrants** (pesticides, fertilisants) dans la réserve naturelle (talus, haies, bandes tampon).

5. Protéger les sols et leur structure

- o Préserver les sols **sableux, caillouteux** ou **moussus**, souvent essentiels à certaines espèces.
- o Éviter le compactage et les aménagements destructeurs sur les talus, pelouses et clairières.



Suivi biologique des réserves naturelles Natagora

Inventaires des punaises pentatomoïdes – 2024

6. Assurer la connectivité écologique

- o Maintenir des **corridors écologiques** entre habitats favorables (haies, bords de routes à gestion douce, ripisylves).

7. Renforcer les connaissances et le suivi des espèces

- o Suivre les **espèces rares, méconnues ou localisées** et mieux comprendre leurs besoins écologiques.
- o Intégrer les résultats dans les plans de gestion des réserves et adapter les interventions en fonction des observations.

Avant de mettre en place des mesures de gestion ciblées, il est essentiel d'évaluer les caractéristiques écologiques du site et de s'appuyer sur le plan de gestion existant. Chaque réserve naturelle possède des milieux spécifiques qui abritent une biodiversité particulière. Plutôt que de chercher à créer de nouveaux types d'habitats ou accueillir d'autres espèces, il est souvent plus pertinent de valoriser ce qui est déjà présent. Cela signifie concentrer les efforts sur la préservation et, si nécessaire, la restauration des habitats existants, afin de renforcer les espèces et les dynamiques écologiques qui y sont naturellement associées.



Figure 6 : Gestion dans la réserve d'Al Florée. Cette vue au drone met en évidence la mosaïque d'habitats présents sur le site, les haies et bosquets, prairies et zones humides permettent d'accueillir une diversité d'espèces de punaises pentatomoïdes. Photo : Damien Sevrin.

FICHES PAR ESPÈCE

La suite du rapport est sous forme de fiche reprenant espèce par espèce plusieurs informations.

Pour chaque espèce les informations suivantes sont reprises :

- Les **noms scientifique** et **vernaculaire** de l'espèce (basés sur la taxonomie d'observations.be)
- Plusieurs **pictogrammes** (voir figure ci-dessous) reprenant le régime alimentaire et la strate principalement utilisée par chaque espèce.
- Le statut de **rareté** (provenant de la base de données observations.be)
- Un lien cliquable vers la page de l'espèce en question sur **observations.be**
- Une **photo de l'espèce** dans son milieu
- Différentes informations sur **l'écologie et la biologie de l'espèce**. Ces paragraphes sont tirés de plusieurs sources différentes en fonction des informations trouvées. Ils sont basés principalement sur la publication « Punaises » de Savoie Etat des connaissances en 2019 (Miquet, 2019), sur l'Atlas de répartition des pentatomorpha aux Pays-Bas (Aukema & Hermes, 2020), soit sur le site INPN (du muséum national français) reprenant les informations Lupoli (2019).
- Les **écorégions et les provinces** dans lesquelles l'espèce a déjà été observée (dans le réseau de réserves naturelles de Natagora)
- Les **sources des données** (observations.be, OFFH et ou iNaturalist)
- La date de la première et dernière **année d'observation** de l'espèce dans le réseau de réserves
- Une **carte** reprenant pour l'espèce les carrés de 5Km où elle a été observée et la période dans laquelle les observations ont été faites
- La **liste des réserves** dans lesquelles l'espèce a déjà été observée

Les fiches peuvent donc servir d'aide dans la recherche des espèces et de support vous permettant d'avoir un complément d'informations sur les espèces présentes dans le réseau de réserves.




Figure 7 : Signification des pictogrammes de régime alimentaire et de strate écologique qui sont situés en haut à droite de chaque fiche espèce.

Acanthosoma haemorrhoidale

Acanthosome rouge-queue

Commun | Observations.be

Total d'observations : 147 | Observations en 2024 : 68 | Validation : 93 %




Photo : Christophe Quintin

Ecologie : Vit sur divers buissons et arbres, se nourrissant de la sève des baies. Il a une génération annuelle, hiverne sous forme adulte, et pond ses œufs sur les feuilles en mai. Les larves se nourrissent de la coquille des œufs et les adultes sont présents toute l'année, avec des pics d'activité au printemps et en automne. Les adultes changent de couleur avant l'hiver.

Habitats occupés : Forêts fraîches, sur nombreuses essences feuillues, notamment à baies, en habitats plutôt ensoleillés.


Plantes hôtes : Aubépines, sorbiers, églantiers et leurs baies ; bouleaux, alisiers, saules, chênes

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2005 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (66) : Abattis, Al Florée, Argilières de Romedenne, Aux Roches, Basse Semois occidentale, Basse Semois orientale, Basse Vallée du Geer, Basse Wimbe, Beaulieu, Beauregard, Behotte, Biron, Bois les Dames, Bondezaie, Brun Chêne, Coin de Suzin, Devant-Bouvignes, Emmels, Enneilles, Ermitage, Etang de Launoy, Fouches, Grand Quarti, Harchies, Haut-Geer, Haute-Sambre, Haute-Sûre, Heinsch, L'Escaille, Le Baquet, Les Briqueteries de Rome, Les Hazalles, Les Hys, Marcasse et alentours, Marionville, Méandre de l'Ourthe, Modave-Triffoy, Mont des Pins, Montagne Saint-Pierre, Nysdam, Plate Dessous les Monts, Prairie du Carpu, Préalles, Prés de Latour, Rechterbach, Ri d'Howisse, Roche Madoux, Roda, Roly, Ronveaux, Ruisseau de Nantimont, Sablière de Nethen, Sampont, Sclaigieux, Sébastopol, Sol Fagne, Soulwez, Thier de Boirs, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de la Wimbe, Viesville, Virelles, Vis Prés, Vodelée, Warchenne, Waremme

Adomerus biguttatus

Séhire baponctué

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 2 | Observations en 2024 : 2 | Validation : 100 %



Photo : Ingrid Altmann

Ecologie : Phytophage de taille moyenne (5,5–7,4 mm), vivant principalement au sol, dans la litière sous le mélampyre des prés (*Melampyrum pratense*), le long des lisières de forêts et des haies. Elle est active de février à octobre, avec une seule génération par an. Les œufs sont pondus en avril-mai et gardés par la femelle. Les adultes de la nouvelle génération émergent à partir de juillet. L'espèce hiverne à l'état adulte dans le sol ou la litière.

Habitats occupés : Prairies fraîches, ourlets, clairières


Plantes hôtes : Mélampyre des prés, épiaire officinale, aubépine

Ecorégions où l'espèce a été observée : Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Liège

Sources des données : observations.be

Première observation en : 2024 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (1) : Thier à la Tombe

Aelia acuminata

Aélie commune

Commun | Observations.be

Total d'observations : 450 | Observations en 2024 : 212 | Validation : 95 %



Photo : Paul en Marianne

Ecologie : Phytophage vivant sur des graminées dans des milieux secs ou modérément humide, sur sol sableux ou calcaires. Elle pond ses œufs au printemps, hiverne sous forme adulte, et a une seule génération annuelle. Les adultes sont actifs toute l'année, avec des pics saisonniers.

Habitats occupés : Tous milieux herbacés, secs ou humides


Plantes hôtes : Diverses graminées, y compris céréales à paille

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Bruxelles, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 1998 | **Dernière observation en :** 2024



● Période d'inventaire (2024) ● Entre 2015 et 2023 ● Avant 2015

Réserves où l'espèce a été observée (97) : Abattis, Al Florée, Argilières de Romedenne, Aux Roches, Basse Semois occidentale, Basse Semois orientale, Basse Vallée du Geer, Basse Wimbe, Beaulieu, Beauregard, Behotte, Biernimont, Biron, Bois de Wadernies, Bois des Fourneaux, Bois les Dames, Brun Chêne, Carrière d'Evieux, Carrière Hannotelet, Chantemelle, Chayneux, Coteau de Warre, Coteaux de Wespín, Coupu Tienne, Deux-Ourthes, Devant-Bouvignes, Dry les Wennes, Emmels, Enneilles, Ensebach-Our, Espace Tilou, Estinnes, Etang de Launoy, Fouches, Fourchinée, Grand Quarti, Großweberbach, Haie Gabaux, Harchies, Haut-Geer, Haute-Sambre, Haute-Sûre, Heinsch, Herbet et Ravenne, Heyoule, His de Marloie, Holzwarche, La Falie, La Picherotte, Lahage, Lavaux-Sainte-Anne, Le Baquet, Les Briqueteries de Rome, Les Hazalles, Les Spinets, Marais de Genneville, Marais de la Vire, Marais de Vance, Marcasse et alentours, Marionville, Modave-Triffoy, Mont des Pins, Montagne Saint-Pierre, Nysdam, Ochamps, Ourthe Orientale, Plate Dessous les Monts, Prairie du Carpu, Prés de Grand Rieu, Prés de la Wamme, Prés de Latour, Ri d'Howisse, Roche Madoux, Roselière de Neerpède, Sablière de Nethen, Sampont, Sclaigheaux, Sébastopol, Soëster, Soulwez, Thier de Boirs, Thier du Gibet, Tiènes de Dailly, Val de Coeurcq, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de la Bacquelaine, Vallée de la Gueule, Vallée de la Gulp, Vallée de la Hulle, Vallée de la Vierre, Vallée de la Wimbe, Vieille Rochette, Viesville, Virelles, Vodelée, Wancennes, Waulsort

Aelia klugii

Aélie de Klug

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 8 | Observations en 2024 : 0 | Validation : 88 %



Photo : Mathieu Derume

Ecologie : Phytophage des milieux ouverts et secs exposés au soleil, vivant sur des graminées comme la fétuque ou nard. Elle hiverne adulte, une seule génération naît par an, avec une activité larvaire de mai à septembre et des adultes visibles jusqu'en octobre.

Habitats occupés : Clairières forestières, les landes à callunes et genêts, les pelouses sèches, les abords des marais et sablières

Plantes hôtes : Nombreux genres de graminées


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz

Provinces où l'espèce a été observée : Luxem-

bourg, Namur

Sources des données : observations.be, OFFH

Première observation en : 2003 | **Dernière observation en :** 2021



Réserves où l'espèce a été observée (2) : Haute-Sûre, Sclaigneaux

Arma custos

Asope sentinelle

Commun | Observations.be

Total d'observations : 33 | Observations en 2024 : 4 | Validation : 88 %



Photo : Bart U.

Ecologie : Zoophage qui vit sur des feuillus, principalement bouleaux et aulnes, et se nourrit de divers insectes, notamment de coléoptères et de chenilles. Il hiverne sous forme adulte et a une génération annuelle. Les larves sont actives de mai à octobre, et les adultes se retrouvent toute l'année avec deux pics d'activité, au printemps et en fin d'été/automne.

Habitats occupés : Lisières et clairières fraîches et humides : aulnaies, saulaies, bords de cours d'eau


Plantes hôtes : Bouleaux, bourdaine, aulnes...

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2000 | **Dernière observation en** : 2024



● Période d'inventaire (2024) ● Entre 2015 et 2023 ● Avant 2015

Réserves où l'espèce a été observée (14) : Aux Roches, Bois les Dames, Coteaux de Wespim, Etang de Launoy, Fouches, Harchies, Marais de la Cussignière, Prairie du Carpu, Ru des Fagnes, Ry d'Oneux, Sablière de Nethen, Sclaigneaux, Vallée de la Gulp, Virelles

Canthophorus impressus

Séhire sillonné

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 6 | Observations en 2024 : 0 | Validation : 100 %



Photo : Wim Declercq

Ecologie : Phytophage vivant au sol de plusieurs espèces de thésiums. Il y a une génération annuelle. Les nymphes rouge peuvent être trouvées jusqu'à fin juillet et les adultes toute l'année.

Habitats occupés : Pelouses écorchées, prairies sèches


Plantes hôtes : Espèce méconnue ; seule plante hôte citée : *Thesium alpinum*

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne

Provinces où l'espèce a été observée : Liège

Sources des données : observations.be

Première observation en : 2019 | **Dernière observation en :** 2019



● Période d'inventaire (2024) ● Entre 2015 et 2023 ● Avant 2015

Réserves où l'espèce a été observée (1) : Holzwarche

Carpocoris fuscispinus

Carpocore robuste

Relativement commun | Observations.be

Total d'observations : 187 | Observations en 2024 : 20 | Validation : 91 %



Photo : j. verstraeten

Ecologie : Phytophage vivant dans des prairies sèches et fleuries ou des friches. Polyphage, elle est souvent observée sur des Asteraceae et Poaceae. Une seule génération annuelle, avec des adultes visibles en été. Elle hiverne à l'état adulte.

Habitats occupés : Milieux secs ou humides et ensoleillés : pelouses sèches et steppiques, boisements clairs bien exposés à forte strate herbacée ; milieux bien fleuris


Plantes hôtes : Composées et graminées

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 1999 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (66) : Abattis, Adrets de Romont, Al Florée, Aux Roches, Basse Semois occidentale, Basse Semois orientale, Bergerie Epipactis, Biron, Boiron, Bois de la Drève, Brun Chêne, Chayneux, Coupu Tienne, Devant-Bouvignes, Dry les Wennes, Emmels, Etang des Canes, Fouches, Gerard & Francis Paquay (Quatre-Vents), Grand Quarti, Großweberbach, Haie Gabaux, Haute-Sûre, Herbet et Ravenne, Holzwarche, La Prée, Lahage, Le Baquet, Les Briqueteries de Rome, Les Glawans, Les Hazalles, Marais de Vance, Marcasse et alentours, Modave-Triffo, Mont des Pins, Montagne Saint-Pierre, Nysdam, Petit Vivier, Pré Morat, Pré Taman, Prés de la Wamme, Prés de Latour, Prés du Village, Ri d'Howisse, Roda, Roly, Roncine, Ry de Bîve, Sampont, Sclaigieux, Soëster, Soulwez, Thier à la Tombe, Thieu, Tiènes de Dailly, Tournailles, Val de Coeurcq, Vallée de la Houille, Vallée de la Hulle, Vallée de la Vierre, Vallon du Wayot, Vieille Rochette, Virelles, Vis Prés, Vodelée, Wiers

Carpocoris purpureipennis

Carpocore pourpré

Commun | Observations.be

Total d'observations : 745 | Observations en 2024 : 162 | Validation : 92 %



Photo : Mireille Henry

Ecologie : Phytophage polyphage vivant dans des prairies fleuries, des pelouses ou des friches. Il hiverne sous forme adulte et produit une seule génération par an. Les larves apparaissent entre mai et octobre, et les adultes sont actifs de mai à octobre, avec des pics de présence au printemps et en été.

Habitats occupés : Tous types d'ombrage ou d'humidité, jusque dans les jardins suffisamment « naturels »

Plantes hôtes : Très nombreux genres dont des chardons, crucifères, graminées ...


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et

Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2000 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (114) : Abattis, Al Florée, Argilières de Romedenne, Aux Roches, Basse Semois orientale, Basse Vallée du Geer, Basse Wimbe, Beaulieu, Beauregard, Bec du Feyi, Behotte, Biron, Boiron, Bois les Dames, Breuvanne, Brun Chêne, Carrière d'Evieux, Chantemelle, Chayneux, Chi Fontaine, Coin de Suzin, Commanster, Comogne, Coteaux de Wespín, Coupu Tienne, Derrière chez Mélanie, Deux-Ourthes, Devant-Bouvignes, Emmels, Enneilles, Etang des Canes, Fouches, Fourchinée, Gerard & Francis Paquay (Quatre-Vents), Glain, Grand Quarti, Grande Honnelle, Haie Gabaux, Harchies, Haute-Sambre, Haute-Sûre, Heinsch, Herbet et Ravenne, Heyoule, Holzwarche, L'Escaille, La Picherotte, La Prée, Lahage, Le Baquet, Les Briqueteries de Rome, Les Hazalles, Les Spinets, Marais de Grendel, Marais de Vance, Marcasse et alentours, Marionville, Matagne, Modave-Triffoý, Mont des Pins, Montagne Saint-Pierre, Noue Marion, Ochamps, Ourthe Orientale, Plate Dessous les Monts, Poncelle, Prairie du Carpu, Pré l'évêque, Pré Taman, Prés de Latour, Prés de Virelles, Rechterbach, Ri d'Howisse, Roche Madoux, Roda, Roly, Ru des Fagnes, Ruisseau de Biran, Ruisseau des Ecrevisses, Ry de Bîve, Sablière de Nethen, Sampont, Sclaigneaux, Sébastopol, Soëster, Sol Fagne, Tchê Coquet, Thier à la Tombe, Thier aux pourcets, Thier de Boirs, Thier de Coïsse, Thier du Gibet, Tibautienne, Tiènes de Dailly, Tienne du Grand Sart, Tournailles, Val de Coeurcq, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de l'Hermeton, Vallée de la Gueule, Vallée de la Gulp, Vallée de la Houille, Vallée de la Hulle, Vallée de la Rulles, Vallée de la Vierre, Vallée de la Wimbe, Vallée des Hayons, Vallon du Wayot, Vieille Rochette, Viesville, Virelles, Vis Prés, Vodelée, Wancennes

Coptosoma scutellatum

Coptosome globuleuse

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 57 | Observations en 2024 : 5 | Validation : 70 %



Photo : Stijn Baeten

Ecologie : Phytophage vivant dans des prairies fleuries, principalement sur des plantes de la famille des Fabacées. Il a une génération annuelle, hiverne sous forme larvaire et est actif de mars à octobre. Les œufs sont pondus en juillet et août sur les feuilles des plantes hôtes.

Habitats occupés : Habite tous types de milieux ouverts à dominante herbacés, semble particulièrement thermophile


Plantes hôtes : Nombreuses légumineuses, arbustives comme herbacées

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 1999 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (20) : Argilières de Romedenne, Aux Roches, Basse Semois orientale, Brun Chêne, Carrière d'Evieux, Coteaux de Wespin, Derrière Vesin, Devant-Bouvignes, Dry les Wennes, Grand Quart, Harchies, Le Baquet, Les Briqueteries de Rome, Marcasse et alentours, Roche Madoux, Sclaigheaux, Vallée de l'Eau d'Yves, Viesville, Virelles, Waulsort

Cydnius aterrimus

Cydne noir

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 1 | Observations en 2024 : 0 | Validation : 100 %



Photo : Boris Loboda

Ecologie : Vit sur des sols chauds et secs où il se nourrit des racines de l'Euphorbia, avec un cycle annuel comprenant une seule génération, où les œufs sont déposés au printemps, et les larves et adultes se nourrissent à la fois sous terre et sur la plante.

Habitats occupés : Sols sableux ou caillouteux bien ensoleillés ; parfois en jardins


Plantes hôtes : Euphorbes, parfois aussi autres fleurs dont potentilles

Ecorégions où l'espèce a été observée : Famenne

Provinces où l'espèce a été observée : Namur

Sources des données : observations.be

Première observation en : 2020 | Dernière observation en : 2020



Réserves où l'espèce a été observée (1) : Tiènes de Dailly

Cyphostethus tristriatus

Acanthosome des genévriers

Relativement commun | Observations.be

Total d'observations : 5 | Observations en 2024 : 1 | Validation : 80 %



Photo : Ryszard

Ecologie : Phytophage qui se nourrit de graines de genévrier et d'autres espèces de la famille des Cupressacées. Il a une génération annuelle et hiverne sous forme adulte. Les larves sont observées de juin à octobre, et les adultes sont présents toute l'année, avec des pics au printemps et à l'automne.

Habitats occupés : Assez thermophile, milieux ouverts relativement secs, les landes où poussent des genévriers isolés et bien exposés au soleil.


Plantes hôtes : Très spécialisé sur les genévriers, certains conifères ornementaux (cyprés, thuya)

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Hainaut, Liège, Namur

Sources des données : observations.be, OFFH

Première observation en : 2000 | Dernière observation en : 2024



Réserves où l'espèce a été observée (5) : Basse Nimelette, Grand Quarti, Montagne Saint-Pierre, Pré à la Peste, Tiènes de Dailly

Dolycoris baccarum

Dolycore des baies

Commun | Observations.be

Total d'observations : 856 | Observations en 2024 : 253 | Validation : 87 %



Photo : Danny Declercq

Ecologie : Majoritairement phytophage qui vit dans des habitats herbeux et secs, comme les champs, les lisières de forêts et les zones urbaines. Il hiberne sous forme adulte et produit une seule génération par an. Les larves apparaissent de mai à novembre, tandis que les adultes sont actifs tout au long de l'année, avec des pics en mai et juillet.

Habitats occupés : Espèce extrêmement commune et ubiquiste sauf en forêt.

Plantes hôtes : Très grand nombre d'espèces de plusieurs familles


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et

Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Bruxelles, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 1998 | **Dernière observation en :** 2024



● Période d'inventaire (2024) ● Entre 2015 et 2023 ● Avant 2015

Réserves où l'espèce a été observée (152) : Abattis, Adrets de Romont, Al Florée, Argilières de Romedenne, Aux Roches, Aux sources de la Jette, Basse Nimelette, Basse Semois occidentale, Basse Vallée du Geer, Basse Wimbe, Beaulieu, Beauregard, Bec du Feyi, Behotte, Bergerie Epipactis, Biernimont, Biron, Bois de la Drève, Bois de Wadergnies, Bondezaie, Braunlauf, Breuvanne, Brun Chêne, Carrière d'Evieux, Carrière Hannotelet, Champs de Neutremont, Chantemelle, Chayneux, Chenogne, Chi Fontaine, Comogne, Coteau de Mont, Coupu Tienne, Cowan, Derrière Vesin, Devant-Bouvignes, Dry les Wennes, Emmels, Enneilles, Ensebach-Our, Ermitage, Etang de Launoy, Etang des Canes, Feschaux, Fosse aux Sables, Fouches, Fourchinée, Gerard & Francis Paquay (Quatre-Vents), Glain, Graide, Grand Quarti, Grande Honnelle, Großweberbach, Haie Gabaux, Harchies, Haut-Geer, Haute-Sambre, Haute-Sûre, Heinsch, Herbet et Ravenne, Heyoule, Holzwarche, L'Escaille, La Falie, La Picherotte, La Prée, Lahage, Le Baquet, Les Briqueteries de Rome, Les Bulles, Les Crayaux, Les Glawans, Les Hazalles, Les Hys, Les Sept Fontaines, Les Spinets, Les Truchettes, Marais de Genneville, Marais de Grendel, Marais de Vance, Marcasse et alentours, Marionville, Matagne, Méandre de l'Ourthe, Modave-Triffoy, Mont des Pins, Montagne Saint-Pierre, Nysdam, Ochamps, Ourthe Orientale, Petit Vivier, Plate Dessous les Monts, Pont Napoléon, Pré du Duc, Pré l'évêque, Pré Taman, Préeles, Prés de la Wamme, Prés de Latour, Prés de Virelles, Rechterbach, Ri d'Howisse, Roche Madoux, Roda, Rognac, Roly, Roncine, Roselière de Neerpède, Ruisseau de Biran, Ruisseau de Mellier, Ruisseau des Ecrevisses, Ry de Bîve, Sablière de Nethen, Sampont, Sarts du Crep, Sclaigneaux, Sébastopol, Soëster, Sol Fagne, Soulwez, Sur Havrenne, Tché Coquet, Terril du Gosson, Thier à la Tombe, Thier de Boirs, Thier du Gibet, Thieu, Tibautienne, Tiènes de Dailly, Tienne du Grand Sart, Tournailles, Trixhe Nollet, Val de Coeurcq, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de la Bacquelaine, Vallée de la Bellemeuse et du Mincée, Vallée de la Gueule, Vallée de la Gulp, Vallée de la Houille, Vallée de la Hulle, Vallée de la Vierre, Vallée de la Wimbe, Vallée des Aleines, Vallon du Wayot, Vieille Rochette, Viesville, Virelles, Vis Prés, Vodelée, Waulsort, Wilbrote, Wyompont

Dyrodere umbraculatus

Sciocore des gaillets

Relativement commun | Observations.be

Total d'observations : 31 | Observations en 2024 : 24 | Validation : 90 %



Photo : Ingeborg van Leeuwen

Ecologie : Phytophage qui se nourrit de galium dans des biotopes secs et chauds. Il a une génération par an et hiverne sous les feuilles mortes, trouvable tout au long de l'année. Les œufs sont déposés sur les tiges et les fleurs de la plante hôte.

Habitats occupés : Habitats chauds mais pas trop secs, ou alors suffisamment ombragés pour que poussent ses plantes hôtes


Plantes hôtes : Gaillets blanc, jaune et gratteron.

Ecorégions où l'espèce a été observée : Condroz, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Bruxelles, Hainaut, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2019 | Dernière observation en : 2024



Réserves où l'espèce a été observée (10) : Harchies, L'Escaille, Marais Chapelle, Marais Saint-Jean, Marcasse et alentours, Marionville, Roselière de Neerpede, Sclaigneaux, Thieu, Val de Coeurcq

Elasmostethus interstinctus

Acanthosome des feuillus

Commun | Observations.be

Total d'observations : 161 | Observations en 2024 : 59 | Validation : 89 %



Photo : Bee Smith

Ecologie : Phytophage vivant sur des arbres comme le bouleau et l'aulne. Il a une génération annuelle, hiverne sous forme adulte et pond ses œufs en mai. Les larves sont présentes de mai à novembre, tandis que les adultes sont actifs toute l'année, avec des pics au printemps et à l'automne. On le capture fréquemment dans des pièges à lumière de mars à octobre.

Habitats occupés : Lisières, bosquets et forêts feuillues claires, pas trop chaudes ni sèches


Plantes hôtes : Essentiellement bouleaux, mais aussi baies de chèvrefeuille, en Savoie trouvé également sur des lierres fortement fructifiés

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2000 | **Dernière observation en :** 2024



● Période d'inventaire (2024) ● Entre 2015 et 2023 ● Avant 2015

Réserves où l'espèce a été observée (55) : Abattis, Aux Roches, Basse Wimbe, Beaulieu, Boiron, Bois de Wadergnies, Bois des Vallées, Bois les Dames, Bourcy, Brun Chêne, Bruyère Mathias, Chantemelle, Deux-Ourthes, Devant-Bouvignes, Emmels, Espace Tilou, Etang de Launoy, Fouches, Fourchinée, Gerard & Francis Paquay (Quatre-Vents), Grand Quarti, Haie Gabaux, Harchies, Heinsch, Holzwarche, Houst,

L'Escaille, Le Baquet, Marcasse et alentours, Marionville, Matagne, Modave-Triffoy, Mont des Pins, Montagne Saint-Pierre, Nysdam, Orchimont, Ourthe Orientale, Plate Dessous les Monts, Prairie du Carpu, Prés de Latour, Ru des Fagnes, Ry d'Oneux, Ry de Bive, Schlaigheaux, Sébastopol, Soëster, Tibautienne, Vallée de l'Almache, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de la Bellemeuse et du Mincée, Vallée de la Gulp, Vallée de la Hulle, Viesville, Virelles, Vis Prés

Elasmostethus minor

Acanthosome des camérisiers

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 12 | Observations en 2024 : 3 | Validation : 50 %



Photo : konrad

Ecologie : Phytophage qui se nourrit des baies de camérisier. Il a une génération annuelle, hiverne sous forme adulte, et son cycle de vie semble similaire à celle d'*E. interstinctus*, avec une activité de vol au printemps et à l'automne.

Habitats occupés : Boisements clairs et lisières à camérisier

Plantes hôtes : Camérisier


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne

Provinces où l'espèce a été observée : Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observa-

tions.be, OFFH

Première observation en : 2000 | Dernière observation en : 2024



Réserves où l'espèce a été observée (6) : Beaulieu, Devant-Bouvignes, Haute-Sambre, Montagne Saint-Pierre, Sclaigneaux, Virelles

Elasmucha fieberi

Acanthosome de Fieber

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 1 | Observations en 2024 : 0 | Validation : 0 %




Photo : Boris Loboda

Ecologie : Phytophage se nourrissant des graines de bouleaux et de aulnes. Il hiverne sous forme adulte et a une génération annuelle. Les femelles protègent les œufs et les jeunes larves. Les larves sont observées à partir de juin, tandis que les adultes sont actifs toute l'année, avec des pics en mai-juin et juillet-août.

Habitats occupés : Forêts, notamment de bouleaux ; aussi noisetiers, aulnes et autre feuillus

Plantes hôtes : Bouleaux


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne

Provinces où l'espèce a été observée : Namur

Sources des données : OFFH

Première observation en : 2000 | **Dernière ob-**

servation en : 2000



Réserves où l'espèce a été observée (1) : Grand Quarti

Elasmucha grisea

Acanthosome grise

Commun | Observations.be

Total d'observations : 172 | Observations en 2024 : 66 | Validation : 87 %



Photo : Ryszard

saules, hêtre

Ecologie : Phytophage vivant sur les bouleaux et les aulnes, avec une génération annuelle. Les femelles protègent les œufs et les jeunes larves. Les larves sont présentes de juin à novembre, et les adultes toute l'année, avec des pics au printemps et en été. Les adultes sont souvent capturés à la lumière ou dans des pièges à fenêtres.

Habitats occupés : Tous bosquets ou boisements de Betulacae : bouleaux, noisetiers, aulnes ; également autres essences feuillues (chêne, charme, peupliers, saules, hêtre) ; même en ville


Plantes hôtes : Principalement bouleaux, mais aussi noisetiers, aulnes, chêne, charme, peupliers,

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2003 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (44) : Al Florée, Aux Roches, Basse Nimelette, Basse Wimbe, Beaugard, Bois les Dames, Bruyère Mathias, Chi Fontaine, Devant-Bouvignes, Espace Tilou, Etang de Launoy, Etang des Canes, Gerard & Francis Paquay (Quatre-Vents), Harchies, Haute-Sambre, Haute-Sûre, Heinsch, Heyoule, Ile aux Corsaires, L'Escaille, Le Baquet, Les Spinets, Marais de la Cussignière, Marcasse et alentours, Marionville, Méandre de l'Ourthe, Modave-Triffois, Mont des Pins, Montagne Saint-Pierre, Ochamps, Plate Dessous les Monts, Pré à la Peste, Rognac, Ru des Fagnes, Ry de Bîve, Sampont, Sclaigneaux, Soëster, Sol Fagne, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de la Hulle, Viesville, Virelles, Vis Prés

Eurydema dominulus

Eurydème souveraine

Rare | Observations.be

Total d'observations : 184 | Observations en 2024 : 32 | Validation : 97 %



Photo : Danny Declercq

Ecologie : *Eurydema dominulus* est un insecte phytophage qui vit principalement sur des Brassicaceae dans des prairies plus ou moins humides, ouvertes et légèrement ombragées. Il a une seule génération par an et hiverne sous forme d'adulte. Les larves se nourrissent principalement en été, tandis que les adultes sont observés de mai à septembre.

Habitats occupés : Prairies, clairières et lisières humides

Plantes hôtes : Genres *Arabis*, *Cardamine* et *Rorippa* ; également des ombellifères


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et

Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2001 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (65) : Abattis, Adrets de Romont, Al Florée, Argilières de Romedenne, Basse Semois occidentale, Beauregard, Bec du Feyi, Boiron, Bois de Wadergnies, Braunlauf, Chantemelle, Chi Fontaine, Emmels, Ennal, Fouches, Glain, Graide, Grand Quarti, Großweberbach, Haie Gabaux, Haute-Sambre, Haute-Sûre, Heinsch, Holzwarche, La Goutelle, La Picherotte, Lahage, Les Briqueteries de Rome, Les Hazalles, Longlier, Marais de Vance, Matagne, Modave-Triffois, Mont des Pins, Ochamps, Orchimont, Petit Vivier, Plate Dessous les Monts, Prairie du Carpu, Pré Taman, Prés de la Wamme, Prés de Virelles, Rechterbach, Ri d'Howisse, Roda, Ru des Fagnes, Ry de Bîve, Sampont, Sébastopol, Soulwez, Tiènes de Dailly, Tournailles, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de la Bellemeuse et du Mincée, Vallée de la Gueule, Vallée de la Gulp, Vallée de la Houille, Vallée de la Houillette, Vallée de la Vierre, Vallée de la Wimbe, Vellereux, Vieille Rochette, Virelles, Vodelée, Wiers

Eurydema oleracea

Eurydème du chou

Commun | Observations.be

Total d'observations : 332 | Observations en 2024 : 118 | Validation : 95 %



Photo : Hubert Baltus

Ecologie : Eurydema oleracea est un insecte phytophage vivant principalement sur les Brassicacées dans divers biotopes. Une génération par an est habituelle, parfois deux au sud. Elle hiverne adulte et est visible toute l'année, avec pics de présence au printemps et en été.

Habitats occupés : Tous milieux avec strate herbacée contenant des crucifères, même cultivées


Plantes hôtes : Nombreuses crucifères, y compris cultivées

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2000 | **Dernière observation en :** 2024



● Période d'inventaire (2024) ● Entre 2015 et 2023 ● Avant 2015

Réserves où l'espèce a été observée (98) : Adrets de Romont, Al Florée, Argilières de Romedenne, Aux Roches, Aux sources de la Jette, Basse Nimelette, Basse Semois occidentale, Basse Wimbe, Behotte, Biernimont, Biron, Boiron, Bois de Wadergnies, Bois les Dames, Breuvanne, Brun Chêne, Carrière d'Evieux, Carrière Hannotelet, Caves Paheau, Chantemelle, Chayneux, Comogne, Coteaux de Wespain, Coupu Tienne, Devant-Bouvignes, Dry les Wennes, Emmels, Ennal, Enneilles, Etang de Launoy, Fouches, Grand Quarti, Grande Honnelle, Harchies, Haute-Sûre, Heinsch, Herbet et Ravenne, Heyoule, Holzwarche, L'Escaille, La Falie, La Prée, Lahage, Le Baquet, Les Briqueteries de Rome, Les Hazalles, Les Spinets, Marais de Genneville, Marais de Vance, Marionville, Matagne, Modave-Triffois, Mont des Pins, Montagne Saint-Pierre, Nysdam, Ochamps, Ourthe Orientale, Plate Dessous les Monts, Pont Napoléon, Prairie du Carpu, Pré Morat, Pré Taman, Prés de Grand Rieu, Prés de la Wamme, Ri d'Howisse, Roche Madoux, Roda, Roly, Ruisseau de Biran, Ruisseau de la Jonquière, Ry de Bive, Sablière de Nethen, Sampont, Sclaigheux, Sébastopol, Soëster, Sol Fagne, Soulwez, Thier à la Tombe, Thieu, Tiènes de Dailly, Tienne du Grand Sart, Val de Coeurcq, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de la Bellemeuse et du Mincée, Vallée de la Gueule, Vallée de la Gulp, Vallée de la Houille, Vallée de la Hulle, Vallée de la Rulles, Vellereux, Vieille Rochette, Viesville, Virelles, Vodelée, Warchenne, Waulsort, Wiers

Eurydema ornata

Eurydème ornée

Relativement commun | Observations.be

Total d'observations : 38 | Observations en 2024 : 15 | Validation : 95 %



Photo : Sebastiaan Stevens

Ecologie : Phytophage vivant dans des habitats secs et chauds, principalement sur des Brassicaceae, mais aussi sur d'autres plantes. Elle hiverné à l'état adulte, a une génération annuelle (deux plus au sud), et les adultes sont présents de mai à octobre.

Habitats occupés : Trouvé dans de nombreux habitats ouverts : prairies, bords de chemins, lisières, même très secs ou humides, jardins ou cultures avec crucifères

Plantes hôtes : Nombreuses brassicacées, y compris cultivées


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et

Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2010 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (24) : Aux Roches, Breuvanne, Comogne, Devant-Bouvignes, Enneilles, Espace Tilou, Fouches, Heinsch, Herbet et Ravenne, Lahage, Marcasse et alentours, Méandre de l'Ourthe, Nysdam, Plate Dessous les Monts, Pont Napoléon, Ri d'Howisse, Roda, Ry de Bive, Soëster, Vallée de la Gulp, Vallée de la Houille, Vallée de la Hulle, Vallée de la Wimbe, Virelles

Eurygaster austriaca

Eurygastre caréné

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 15 | Observations en 2024 : 4 | Validation : 87 %



Photo : Elias Van Den Broeck

Ecologie : Phytophage des milieux secs et chauds, vivant sur des graminées. Il hiverné à l'état adulte et a une génération par an. Les larves se nourrissent des tiges, puis des graines en maturation. Les adultes sont visibles principalement au printemps et à la fin de l'été.

Habitats occupés : Praires, landes, pelouses sèches comportant de très hautes graminées, peu ou pas « gérés »


Plantes hôtes : Graminées dont notamment les avoines Avena et Avenula

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : observations.be, OFFH

Première observation en : 2005 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (8) : Devant-Bouvignes, Fourchinée, Marcasse et alentours, Ochamps, Ru des Fagnes, Tiènes de Dailly, Vallée de la Houille, Vallée de la Hulle

Eurygaster maura

Eurygastre des friches

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 55 | Observations en 2024 : 16 | Validation : 65 %



Photo : a vijfje

Ecologie : Phytophage des milieux secs, vivant sur diverses graminées. Les larves se nourrissent de feuilles ou de graines, et les adultes aussi de graines, parfois d'Astéracées. Une seule génération annuelle, hibernation à l'état adulte. Œufs pondus dès mai, adultes visibles d'avril à octobre, surtout en été.

Habitats occupés : Milieux herbacés plutôt en marge des prairies : friches, ourlets, lisières


Plantes hôtes : Nombreuses graminées (dont Bromopsis et Arrhenatherum), parfois des céréales

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 1999 | **Dernière observation en :** 2024



● Période d'inventaire (2024) ● Entre 2015 et 2023 ● Avant 2015

Réserves où l'espèce a été observée (25) : Argilières de Romedenne, Aux Roches, Behotte, Breuvanne, Chantemelle, Coteaux de Wespín, Devant-Bouvignes, Enneilles, Fouches, Grand Quarti, Herbet et Ravenne, Le Baquet, Les Briqueteries de Rome, Les Spinets, Marcasse et alentours, Modave-Triffoy, Montagne Saint-Pierre, Sclaigheaux, Thier à la Tombe, Tiènes de Dailly, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de la Houille, Vallée de la Hulle, Virelles, Vodelée

Eurygaster testudinaria

Eurygastre tortue

Commun | Observations.be

Total d'observations : 389 | Observations en 2024 : 162 | Validation : 89 %



Photo : Johan R

Ecologie : Phytophage vivant dans des biotopes secs et modérément humides, ouverts ou légèrement ombragés, principalement sur des graminées, les joncs et les carex. Il se nourrit des graines mûrissantes et hiverne sous forme adulte. Il a une génération par an, avec des larves observées de mai à septembre et des adultes actifs de fin avril à fin octobre, avec des pics en mai-juin et juillet-août.

Habitats occupés : Se trouve dans la plupart des milieux herbacés, secs comme humides.

Plantes hôtes : Nombreuses graminées


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et

Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Bruxelles, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2000 | **Dernière observation en :** 2024



● Période d'inventaire (2024) ● Entre 2015 et 2023 ● Avant 2015

Réserves où l'espèce a été observée (111) : Abattis, Al Florée, Argilières de Romedenne, Aux Roches, Aux sources de la Jette, Basse Semois occidentale, Basse Semois orientale, Basse Vallée du Geer, Basse Wimbe, Bec du Feyi, Behotte, Biron, Boiron, Bois de la Drève, Bois de Wadergnies, Bois les Dames, Bondezaie, Breuvanne, Brun Chêne, Carrière d'Evieux, Carrière Hannotelet, Chantemelle, Chayneux, Chi Fontaine, Coin de Suzin, Comogne, Coteaux de Wespain, Devant-Bouvignes, Dry les Wennes, Emmels, Ennal, Enneilles, Ensebach-Our, Ermitage, Espace Tilou, Fouches, Fourchinée, Glain, Grand Quarti, Großweberbach, Haie Gabaux, Harchies, Haut-Geer, Haute-Sambre, Haute-Sûre, Heinsch, Herbet et Ravenne, Holzwarche, Lahage, Le Baquet, Les Briqueteries de Rome, Les Crayaux, Les Hazalles, Les Spinets, Longlier, Marais de Genneville, Marais de Grendel, Marais de Vance, Marcasse et alentours, Matagne, Méandre de l'Ourthe, Modave-Triffoy, Mont des Pins, Montagne Saint-Pierre, Nysdam, Ochamps, Orchimont, Ourthe Orientale, Petit Vivier, Plate Dessous les Monts, Prairie du Carpu, Pré Morat, Prés de la Wamme, Prés du Village, Rechterbach, Ri d'Howisse, Roche Madoux, Roda, Roselière de Neerpède, Ru des Fagnes, Ruisseau de Biran, Ry de Bive, Sablière de Nethen, Sampont, Schlaigheux, Sébastopol, Soëster, Soulwez, Tché Coquet, Thier à la Tombe, Tibautienne, Tiènes de Dailly, Tournailles, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de la Bacquelaine, Vallée de la Bellemeuse et du Mincée, Vallée de la Gueule, Vallée de la Gulp, Vallée de la Houille, Vallée de la Houillette, Vallée de la Hulle, Vallée de la Vierre, Vallée de la Wimbe, Vallée des Aleines, Vallon du Wayot, Viesville, Virelles, Vis Prés, Vodelée, Warchenne, Wiers

Eysarcoris aeneus

Eysarcore des landes

Relativement commun | Observations.be

Total d'observations : 129 | Observations en 2024 : 47 | Validation : 85 %



Photo : Lander Kestemont

Ecologie : Phytophage vivant dans des prairies sèches, souvent sur le plantain lancéolé. Polyphage à l'âge adulte, elle produit une génération par an et hiberne sous forme adulte. On observe les larves en été et deux pics d'adultes : au printemps et à la fin de l'été.

Habitats occupés : Espèce des prairies humides et cariçaies, berges, clairières fraîches


Plantes hôtes : Lamiacées des genres Clinopodium, Galeopsis, Prunella, Stachys

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Bruxelles, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2000 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (49) : Abattis, Argilières de Romedenne, Basse Nimelette, Basse Semois occidentale, Basse Semois orientale, Behotte, Biron, Bois de Wadergnies, Chantemelle, Chayneux, Coteaux de Wespain, Devant-Bouvignes, Fouches, Fourchinée, Grand Quarti, Harchies, Haute-Sambre, Haute-Sûre, Houst, La Picherotte, La Prée, Lahage, Le Baquet, Les Briqueteries de Rome, Les Hazalles, Les Spinets, Longlier, Marais de Vance, Matagne, Nysdam, Ochamps, Prairie du Carpu, Ri d'Howisse, Roda, Roselière de Neerpède, Ruisseau de Mellier, Ry de Bive, Sclaigneaux, Soëster, Tiènes de Dailly, Val de Coeurcq, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de la Houille, Vallée de la Hulle, Vallée de la Vierre, Vallée des Aleines, Vieille Rochette, Virelles, Vis Prés

Geotomus petiti

Géotome de Petit

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 1 | Observations en 2024 : 0 | Validation : 100 %



Photo : Nicolas Orliac

Ecologie : Une espèce fousseuse vivant enfouie au pied de plantes ou dans les débris végétaux. Elle a aussi été trouvée au sol des landes acides à bruyères, genets et cistes. Son régime alimentaire est inconnu. Elle est observable de mars à septembre.

Habitats occupés : C'est une espèce des milieux sablonneux, dunaires, des estuaires et à l'intérieur des terres, proche des rivières.


Plantes hôtes : Inconnu

Ecorégions où l'espèce a été observée : Nord
sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Liège

Sources des données : observations.be

Première observation en : 2023 | Dernière observation en : 2023



Réserves où l'espèce a été observée (1) : Thier à la Tombe

Graphosoma italicum

Graphosome pyjama

Commun | Observations.be

Total d'observations : 1167 | Observations en 2024 : 387 | Validation : 92 %



Photo : Danny Declercq

Ecologie : Phytophage qui se nourrit des graines sur les ombelles d'Apiacées. Il vit dans des habitats herbacés et ensoleillés, tels que des prairies ou jardins. Il hiverne en tant qu'adulte et produit une génération par an. Les larves sont observables entre juin et octobre et les adultes sont actifs de mars à novembre, avec des pics de présence en mai et juillet.

Habitats occupés : Tous milieux herbacés secs à humides, dès lors qu'ils comportent des ombellifères


Plantes hôtes : Nombreux genres d'ombellifères

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 1998 | **Dernière observation en :** 2024



● Période d'inventaire (2024) ● Entre 2015 et 2023 ● Avant 2015

Réserves où l'espèce a été observée (150) : Abattis, Adrets de Romont, Al Florée, Argilières de Romedenne, Aux Roches, Basse Vallée du Geer, Basse Wimbe, Beaulieu, Beauregard, Bec du Feyi, Behotte, Biron, Bois de la Drève, Bois de Wadergnies, Bois des Fourneaux, Braunlauf, Breuvanne, Brouhire d'Emael, Brun Chêne, Chantemelle, Chayneux, Chi Fontaine, Coin de Suzin, Coteau de Warre, Coupu Tienne, Derrière chez Mélanie, Devant-Bouvignes, Dry les Wennes, Emmels, Enneilles, Ensebach-Our, Ermitage, Espace Tilou, Etang de Launoy, Etang des Canes, Feschaux, Fouches, Fourchinée, Gerard & Francis Paquay (Quatre-Vents), Glain, Grand Quarti, Grande Honnelle, Großweberbach, Haie Gabaux, Harchies, Haut-Geer, Haute-Sambre, Haute-Sûre, Heinsch, Herbet et Ravenne, Heyoule, His de Marloie, Holzwarche, Ile aux Corsaires, Kolvenderbach, L'Escaille, La Falie, La Prée, Lahage, Lande du Chaineux, Lavaselle, Le Baquet, Les Briqueteries de Rome, Les Crayaux, Les Glawans, Les Hazalles, Les Hys, Les Sept Fontaines, Les Spinets, Les Truchettes, Marais Chapelle, Marais de Genneville, Marais de la Cussignière, Marais de Vance, Marais Saint-Jean, Marcasse et alentours, Mariembourg, Marionville, Matagne, Merlemont, Modave-Triffoy, Mont des Pins, Montagne Saint-Pierre, Orchimont, Ourthe Orientale, Petit Vivier, Plate Dessous les Monts, Poncelle, Pont Napoléon, Pré à la Peste, Pré Morat, Préeles, Prés de Grand Rieu, Prés de Latour, Prés du Village, Rechterbach, Ri d'Howisse, Roche Madoux, Roda, Roly, Roncine, Ru des Fagnes, Ruisseau de Biran, Ruisseau de Mellier, Ruisseau des Ecrevisses, Ry de Bive, Sablière de Nethen, Sampont, Sarts du Crep, Sclaigheux, Sébastopol, Soëster, Sol Fagne, Soulwez, Tché Coquet, Terril du Gosson, Thier à la Tombe, Thier aux pourcets, Thier d'Ozo, Thier de Boirs, Thier du Gibet, Thommen, Tiènes de Dailly, Tienne du Grand Sart, Tournailles, Val de Coeurcq, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de l'Hermeton, Vallée de la Gueule, Vallée de la Gulp, Vallée de la Houille, Vallée de la Hulle, Vallée de la Rulles, Vallée de la Vierre, Vallée de la Warche, Vallée de la Wimbe, Vallée des Aleines, Vallon du Wayot, Vellereux, Verger d'Ambly, Vieille Rochette, Virelles, Vis Prés, Vivi des Bois, Vodelée, Wancennes, Warchenne, Waulsort, Wiers, Wyompont

Halyomorpha halys

Punaise diabolique

Relativement commun | Observations.be

Total d'observations : 9 | Observations en 2024 : 8 | Validation : 78 %



Photo : Gilles San Martin

Ecologie : Ravageur phytophage très polyphage, causant des dégâts sur une grande variété de cultures et de plantes ornementales. Il hiverne comme adulte, et bien qu'une ou deux générations soient possibles en Europe, jusqu'à six sont observées en Asie. Il peut aussi causer des nuisances dans les habitations en hiver.

Habitats occupés : Pour l'instant surtout cantonnée aux zones périurbaines.


Plantes hôtes : Extrêmement nombreuses ; dégâts possibles pour l'arboriculture

Ecorégions où l'espèce a été observée : Condroz, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Liège, Luxembourg

Sources des données : observations.be, OFFH

Première observation en : 2021 | Dernière observation en : 2024



Réserves où l'espèce a été observée (4) : Aux Roches, Basse Vallée du Geer, Haut-Geer, Plate Dessous les Monts

Holcogaster fibulata

Holcogastre des conifères

Relativement commun | Observations.be

Total d'observations : 6 | Observations en 2024 : 1 | Validation : 83 %



©dannydeclercq.com

Photo : Danny Declercq

Ecologie : Zoophytophage qui se nourrit principalement des graines de conifères et d'œufs de papillons. Elle vit dans les forêts, les lisières et les haies. Elle hiberne en tant qu'adulte et semble avoir une génération par an en Europe du Nord.

Habitats occupés : Bosquets et lisières chauds et secs


Plantes hôtes : Genévriers et pins

Ecorégions où l'espèce a été observée : Condroz

Provinces où l'espèce a été observée : Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be

Première observation en : 2021 | **Dernière observation en :** 2024



● Période d'inventaire (2024) ● Entre 2015 et 2023 ● Avant 2015

Réserves où l'espèce a été observée (2) : Dry les Wennes, Sclaigneaux

Holcostethus sphacelatus

Périgale des molènes

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 11 | Observations en 2024 : 1 | Validation : 18 %



Photo : Lander Kestemont

Ecologie : Phytophage vivant dans des habitats secs et herbeux, souvent sur des sols calcaires. Elle se nourrit de diverses plantes, notamment des baies et des herbes. Elle hiverne sous forme adulte et a une seule génération annuelle, avec des adultes visibles tout au long de l'année.

Habitats occupés : Milieux variés et ensoleillés, jusqu'aux forêts claires à sous-bois herbacés


Plantes hôtes : Très diverses, mais particulièrement Verbascum, Reseda, Centranthus, Achillea, Vacinium

Ecorégions où l'espèce a été observée : Condroz, Famenne

Provinces où l'espèce a été observée : Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : observations.be, OFFH

Première observation en : 2006 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (5) : Aux Roches, Carrière d'Evieux, Chayneux, Comblinay, Devant-Bouvignes

Legnotus limbosus

Légnote commun

Relativement commun | Observations.be

Total d'observations : 46 | Observations en 2024 : 21 | Validation : 76 %



Photo : Paul en Marianne

Ecologie : Phytophage (3,5–4,5 mm) vivant dans des habitats chauds et sablonneux, principalement sur le gaillet gratteron. Il a une génération par an, hiverne sous forme adulte dans la litière et la mousse, et ses larves apparaissent de mai à septembre. Les adultes sont présents toute l'année, mais sont plus visibles au printemps, notamment après l'hivernation, période où ils volent et se trouvent sur diverses plantes.

Habitats occupés : Végétation herbacée dense, lisières, ourlets, talus routiers, abords de cours d'eau


Plantes hôtes : Gallium aparine, G. verum et G. mollugo

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2007 | **Dernière observation en :** 2024



● Période d'inventaire (2024) ● Entre 2015 et 2023 ● Avant 2015

Réserves où l'espèce a été observée (28) : Al Florée, Aux Roches, Basse Wimbe, Behotte, Biron, Carrière d'Evieux, Carrière Hannotelet, Devant-Bouvignes, Emmels, Fouches, Grande Honnelle, Harchies, Herbet et Ravenne, His de Marloie, Ile aux Corsaires, Le Baquet, Les Briqueteries de Rome, Les Hazalles, Modave-Triffois, Mont des Pins, Montagne Saint-Pierre, Sclaigheaux, Vallée de la Gulp, Vallée de la Hulle, Vallée de la Wimbe, Virelles, Vis Prés, Waulsort

Legnotus picipes

Légnote à pattes noires

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 8 | Observations en 2024 : 2 | Validation : 75 %



Photo : Brigitte Van Passel

Ecologie : Phytophage (3,2-4,3 mm) vivant dans des habitats acides, principalement dans les dunes et les landes, où il se nourrit de galium saxatile. Il a une génération annuelle, hiverne sous forme adulte et est actif de mars à octobre, avec un pic de reproduction en juin. Les larves apparaissent de fin mai à août.

Habitats occupés : Pelouses, ourlets ; habitats herbacés ou moussus, denses ou non

Plantes hôtes : Gallium aparine, verum, anisophyllum et mollugo


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine

Provinces où l'espèce a été observée : Liège,

Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2012 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (5) : Aux Roches, Haute-Sûre, Lahage, Mont des Pins, Vis Prés

Neottiglossa leporina

Néottiglosse des prés

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 4 | Observations en 2024 : 2 | Validation : 100 %



Photo : Hubert Baltus

Ecologie : Vit dans les milieux herbeux riches en graminées, secs ou humides, mais exceptionnellement dans les prairies cultivées. Elle se retrouve uniquement sur différentes graminées dont les paturins, fétuques et agrostides. L'espèce est observable de mai à septembre, avec un pic en août.

Habitats occupés : Dans des milieux herbeux riches en graminées, secs ou humides.

Plantes hôtes : Plusieurs graminées dont des Poa, Festuca et Agrostis


Ecorégions où l'espèce a été observée : Condroz, Lorraine

Provinces où l'espèce a été observée : Liège,

Luxembourg

Sources des données : observations.be

Première observation en : 2020 | Dernière observation en : 2024



Réserves où l'espèce a été observée (3) : Fouches, Heinsch, Soëster

Neottiglossa pusilla

Néottiglosse naine

Rare | Observations.be

Total d'observations : 69 | Observations en 2024 : 24 | Validation : 72 %



Photo : Tim Worfolk

Ecologie : Phytophage vivant sur les graminées et cypéracées dans des milieux ouverts et variés en humidité. Elle hiverne adulte, s'accouple au printemps et donne une seule génération annuelle. Les larves apparaissent en juin et les adultes sont visibles de mars à octobre.

Habitats occupés : On la rencontre en milieux herbeux, frais et humides, sur sol acide : landes à bruyères et molinies, abords des marais et des tourbières, clairières, lisières forestières, et prairies naturelles

Plantes hôtes : Plusieurs genres de graminées


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne,

Condroz, Famenne, Lorraine

Provinces où l'espèce a été observée : Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 1999 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (25) : Aux Roches, Basse Semois occidentale, Bois les Dames, Chayneux, Coteaux de Wespim, Devant-Bouvignes, Enneilles, Graide, Grand Quart, Haute-Sûre, Herbet et Ravenne, Holzwarche, Lahage, Les Briqueteries de Rome, Les Hazalles, Marais de Vance, Ochamps, Ourthe Orientale, Ri d'Howisse, Sclaigheux, Soëster, Tiènes de Dailly, Vallée de la Houille, Vallée de la Hulle, Vallée de la Vierre

Nezara viridula

Pentatome cosmopolite

Commun | Observations.be

Total d'observations : 9 | Observations en 2024 : 6 | Validation : 78 %



Photo : Christophe Quintin

Ecologie : Phytophage très nuisible, présent dans les milieux rudéraux. Elle s'attaque à plus de 145 genres de plantes, causant de gros dégâts aux cultures. Elle hiverne comme adulte, a une génération annuelle en extérieur et plusieurs en serre. Elle change de couleur en automne et peut présenter une forme méridionale marquée de jaune.

Habitats occupés : Tous habitats bien exposés y compris jardins et cultures


Plantes hôtes : Extrêmement nombreuses dont légumes (tomates, crucifères ...)

Ecorégions où l'espèce a été observée : Condroz, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Liège, Luxembourg

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2019 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (4) : Aux Roches, Haut-Geer, Montagne Saint-Pierre, Prés de Latour

Odontoscelis fuliginosa

Odontoscèle fuligineux

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 2 | Observations en 2024 : 0 | Validation : 100 %



Photo : Gilles San Martin

Ecologie : Phytophage vivant dans des biotopes chauds et secs, à végétation clairsemée sur des sols sableux et calcaires. Il se nourrit des racines de diverses plantes, notamment des légumineuses, et devient actif au-dessus du sol par temps chaud. Il hiverne sous forme de larve et a une génération annuelle, avec des larves observées au printemps et des adultes actifs de mai à novembre.

Habitats occupés : Milieux à sols écorchés ou au couvert végétal faible ou ras

Plantes hôtes : Geraniacées, Dianthus sp., Malva sp., Ononis natrix


Ecorégions où l'espèce a été observée : Lorraine,

Nord sillonn Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Liège, Luxembourg

Sources des données : observations.be

Première observation en : 2017 | **Dernière observation en :** 2022



Réserves où l'espèce a été observée (2) : Chantemelle, Heyoule

Palomena prasina

Palomène verte

Commun | Observations.be

Total d'observations : 811 | Observations en 2024 : 331 | Validation : 86 %



Photo : Raymond Vandenhoudt

Ecologie : Phytophage vivant dans une variété de milieux, comme les zones herbeuses, les lisières de forêts et sur des arbres feuillus. Elle se nourrit principalement des graines et des fruits de ses plantes hôtes. Elle a une seule génération par an et présente une dimorphie saisonnière où elle passe du vert au brun avant l'hiver, puis redevient verte au printemps. Les adultes sont actifs de mars à novembre, avec des pics de présence en avril-juin et août-octobre.

Habitats occupés : Très nombreux milieux secs ou humides, ensoleillés ou non


Plantes hôtes : Très nombreuses essences feuillues et genres herbacés

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Bruxelles, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2000 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (137) : Abattis, Al Florée, Argilières de Romedenne, Aux Roches, Aux sources de la Jette, Basse Nimelette, Basse Semois occidentale, Basse Semois orientale, Basse Vallée du Geer, Basse Wimbe, Beaulieu, Beauregard, Bec du Feyi, Behotte, Biernimont, Biron, Boiron, Bois de la Drève, Bois de Wadergnies, Bois des Fourneaux, Bois des Vallées, Bois les Dames, Bondezaie, Braunlauf,

Breuvanne, Brun Chêne, Carrière d'Evieux, Champs de Neutremont, Chantemelle, Coin de Suzin, Comogne, Coteaux de Wespin, Coupu Tienne, Deux-Ourthes, Devant-Bouvignes, Dry les Wennes, Emmels, Ennal, Ensebach-Our, Ermitage, Espace Tilou, Etang de Launoy, Feschaux, Fosse aux Sables, Fouches, Fourchinée, Glain, Grand Quarti, Haie Gabaux, Harchies, Haut-Geer, Haute-Sambre, Haute-Sûre, Heinsch, Herbet et Ravenne, Heyoule, His de Marloie, Holzwarche, Ile aux Corsaires, L'Escaille, La Picherotte, La Prée, Lahage, Le Baquet, Les Briqueteries de Rome, Les Bulles, Les Crayaux, Les Glawans, Les Hazalles, Les Hys, Les Sept Fontaines, Les Spinets, Longlier, Mandebbras, Marais Chapelle, Marais de Genneville, Marais de Vance, Marcasse et alentours, Marionville, Matagne, Méandre de l'Ourthe, Modave-Triffoy, Mont des Pins, Montagne Saint-Pierre, Nysdam, Ochamps, Orchimont, Ourthe Orientale, Plate Dessous les Monts, Poncelle, Prairie du Carpu, Pré à la Peste, Pré Taman, Préeles, Rechterbach, Roche Madoux, Roda, Roly, Ronveaux, Roselière de Neerpède, Ruisseau de Mellier, Ry d'Oneux, Ry de Bîve, Sablière de Nethen, Sampont, Sclaigheaux, Sébastopol, Soëster, Sol Fagne, Soulwez, Sur Havrenne, Terril du Gosson, Thier à la Tombe, Thier de Boirs, Thieu, Tibautienne, Tiènes de Dailly, Tienne de Dion, Trixhe Nollet, Val de Coeurcq, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de la Gueule, Vallée de la Gulp, Vallée de la Houille, Vallée de la Hulle, Vallée de la Rulles, Vallée de la Vierre, Vallée de la Wimbe, Vallée des Hayons, Vallon du Wayot, Vieille Rochette, Viesville, Virelles, Vis Prés, Vodelée, Warchenne, Waulsort

Palomena viridissima

Grande Palomène

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 7 | Observations en 2024 : 0 | Validation : 43 %



©dannydeclercq.com

Photo : Danny Declercq

Ecologie : Phytophage qui vit dans des milieux secs à humides tels que les prairies et les lisières de forêts. Elle a un cycle de vie d'une génération par an et hiberne sous forme d'adulte. Sa biologie et son cycle de vie sont similaires à ceux de *P. prasina*, avec des pics d'activité en mai, août et septembre.

Habitats occupés : Lisières et landes fraîches

Plantes hôtes : Divers feuillus


Ecorégions où l'espèce a été observée : Condroz, Famenne, Lorraine

Provinces où l'espèce a été observée : Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observa-

tions.be, OFFH

Première observation en : 2003 | Dernière observation en : 2017



Réserves où l'espèce a été observée (4) : Devant-Bouvignes, Heinsch, Ri d'Howisse, Sclaigheaux

Pentatoma rufipes

Pentatome à pattes rouges

Commun | Observations.be

Total d'observations : 422 | Observations en 2024 : 139 | Validation : 96 %



Photo : Danny Declercq

Ecologie : Zoophytophage qui se nourrit de la sève des arbres feuillus et résineux, ainsi que d'œufs et de larves d'autres insectes. Il vit dans divers habitats, y compris urbains. Il hiverne sous forme de larve et a une seule génération par an. Les larves sont les plus nombreuses de fin mai à début juillet, tandis que les adultes sont présents de mai à décembre.

Habitats occupés : Tous types de forêts jusqu'aux arbres isolés, surtout feuillus

Plantes hôtes : Nombreux arbres et arbustes feuillus, pins


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et

Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2000 | **Dernière observation en :** 2024



● Période d'inventaire (2024) ● Entre 2015 et 2023 ● Avant 2015

Réserves où l'espèce a été observée (109) : Abattis, Argilières de Romedenne, Aux Roches, Basse Nimelette, Basse Semois occidentale, Basse Semois orientale, Basse Vallée du Geer, Beaulieu, Beauregard, Bec du Feyi, Biron, Boiron, Bois de Wadergnies, Bois des Vallées, Bois du Fil Maillet, Bois les Dames, Breuvanne, Brun Chêne, Bruyère Mathias, Carrière d'Evieux, Chantemelle, Chi Fontaine, Coin de Suzin, Deux-Ourthes, Devant-Bouvignes, Enneilles, Ermitage, Espace Tilou, Etang de Launoy, Etang des Canes, Fourchinée, Gerard & Francis Paquay (Quatre-Vents), Glain, Grand Quarti, Grande Honnelle, Haie Gabaux, Harchies, Haut-Geer, Haute-Sambre, Haute-Sûre, Heinsch, His de Marloie, Holzwarche, Houst, Ile aux Corsaires, La Picherotte, Lahage, Le Baquet, Les Briqueteries de Rome, Les Burettes, Les Crayaux, Les Hazalles, Les Hys, Mandebbras, Marais Chapelle, Marais de Vance, Marais Saint-Jean, Marcasse et alentours, Marionville, Matagne, Modave-Triffoy, Mont des Pins, Montagne Saint-Pierre, Nysdam, Ochamps, Ourthe Orientale, Plate Dessous les Monts, Pont Napoléon, Prairie du Carpu, Pré Taman, Prés de la Wamme, Prés de Latour, Ri d'Howisse, Roda, Rognac, Roly, Ronveaux, Ruisseau de la Jonquière, Ruisseau de Mellier, Ry de Bîve, Sablière de Nethen, Sampont, Sclaingneaux, Sébastopol, Soëster, Sol Fagne, Soulwez, Terril Frederic, Thier à la Tombe, Thier d'Ozo, Thier de Boirs, Thieu, Tournailles, Trixhe Nollet, Val de Coeurcq, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de la Bacquelaine, Vallée de la Gueule, Vallée de la Gulp, Vallée de la Houille, Vallée de la Hulle, Vallée de la Wimbe, Vieille Rochette, Viesville, Virelles, Vis Prés, Wancennes, Warchenne, Waremme

Peribalus strictus

Péribale printanier

Commun | Observations.be

Total d'observations : 221 | Observations en 2024 : 76 | Validation : 82 %



Photo : Danny Declercq

Ecologie : Phytophage qui se nourrit des graines de diverses plantes herbacées dans des environnements secs et chauds. Il hiberne en tant qu'adulte et produit une seule génération par an, avec des larves observées entre mai et octobre. Les adultes sont présents toute l'année, avec des pics de population en mai et août.

Habitats occupés : Lisières, prairies, friches, haies et bosquets ...


Plantes hôtes : Scrophulariacées, Astéracées, Brassicacées, Fabacées, chênes ...

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2000 | **Dernière observation en :** 2024



● Période d'inventaire (2024) ● Entre 2015 et 2023 ● Avant 2015

Réserves où l'espèce a été observée (74) : Al Florée, Aux Roches, Basse Nimelette, Basse Semois orientale, Basse Vallée du Geer, Basse Wimbe, Bec du Feyi, Biernimont, Biron, Boiron, Bois les Dames, Brun Chêne, Carrière Hannotelet, Chantemelle, Devant-Bouvignes, Dry les Wennes, Emmels, Espace Tilou, Etang de Launoy, Fosse aux Sables, Fouches, Grand Quarti, Grande Honnelle, Großweberbach, Harchies, Haute-Sambre, Haute-Sûre, Heinsch, Herbet et Ravenne, Holzwarche, L'Escaille, La Motte du Brabant, La Prée, Lahage, Le Baquet, Les Briqueteries de Rome, Les Hazalles, Les Hys, Les Sept Fontaines, Les Spinets, Marais de Vance, Marcasse et alentours, Matagne, Modave-Triffoy, Mont des Pins, Montagne Saint-Pierre, Ochamps, Ourthe Orientale, Pont Napoléon, Prairie du Carpu, Rechterbach, Ri d'Howisse, Roche Madoux, Roda, Sablière de Nethen, Sclaigneaux, Soëster, Soulwez, Thier de Boirs, Thier du Gibet, Tibautienne, Tiènes de Dailly, Val de Coeurcq, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de la Gueule, Vallée de la Gulp, Vallée de la Houille, Vallée de la Hulle, Vallée de la Vierre, Vallée de la Wimbe, Vallon du Wayot, Virelles, Vis Prés, Warchenne

Picromerus bidens

Asope bidenté

Relativement commun | Observations.be

Total d'observations : 88 | Observations en 2024 : 7 | Validation : 98 %



Photo : Raymond Vandenhoudt

Ecologie : Prédateur zoophage vivant dans des prairies, landes et lisières forestières, se nourrissant principalement de chenilles et de larves de coléoptères. Il hiverne sous forme d'œuf et produit une génération par an. Les larves apparaissent entre mai et octobre, et les adultes sont présents de mai à octobre, avec des pics en août-septembre.

Habitats occupés : Boisements, lisières et prairies fraîches voire humides


Plantes hôtes : /

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2001 | **Dernière observation en :** 2024



● Période d'inventaire (2024) ● Entre 2015 et 2023 ● Avant 2015

Réserves où l'espèce a été observée (46) : Al Florée, Argilières de Romedenne, Basse Wimbe, Bec du Feyi, Boiron, Braunlauf, Champs de Neutremont, Chantemelle, Chi Fontaine, Comogne, Devant-Bouvignes, Emmels, Ermitage, Fouches, Graide, Grand Quart, Haie Gabaux, Harchies, Haut-Geer, Haute-Sambre, Haute-Sûre, Holzwarche, Le Baquet, Marais de Grendel, Marais de la Cussignière, Marais de Vance, Marionville, Matagne, Montagne Saint-Pierre, Orchimont, Pré Taman, Ri d'Howisse, Roda, Ruisseau de la Jonquière, Ry d'Oneux, Ry de Bîve, Sclaingneaux, Soëster, Tiènes de Dailly, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de la Gueule, Vallée de la Houille, Vallée de la Hulle, Vieille Rochette, Virelles, Warchenne

Piezodorus lituratus

Piézodore des genêts

Commun | Observations.be

Total d'observations : 258 | Observations en 2024 : 112 | Validation : 86 %



Photo : Paul en Marianne

Ecologie : Phytophage vivant dans des biotopes secs, se nourrissant principalement de graines de légumineuses. Il hiverne en tant qu'adulte et a une seule génération par an. Les adultes sont présents d'avril à novembre, avec des pics durant le printemps et au début de l'été, puis en été et automne.

Habitats occupés : Versants exposés, pelouses sèches colonisées par les ligneux ; nettement thermoxérophile

Plantes hôtes : Cytise, genêts, luzerne ; fréquente aussi les arbustes au moins comme gîtes


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et

Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2000 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (69) : Al Florée, Aux Roches, Biernimont, Biron, Boiron, Brun Chêne, Bruyère Mathias, Carrière d'Evieux, Carrière Hannotelet, Chantemelle, Chayneux, Coteaux de Wespain, Deux-Ourthes, Devant-Bouvignes, Dry les Wennes, Enneilles, Espace Tilou, Fouches, Fourchinée, Gerard & Francis Paquay (Quatre-Vents), Grand Quarti, Harchies, Haute-Sûre, Heinsch, Herbet et Ravenne, Holzwarche, Lahage, Le Baquet, Les Briqueteries de Rome, Les Crayaux, Les Hazalles, Les Spinets, Longlier, Marais de Vance, Marcasse et alentours, Matagne, Mont des Pins, Montagne Saint-Pierre, Nysdam, Ochamps, Orchimont, Ourthe Orientale, Plate Dessous les Monts, Prairie du Carpu, Pré Morat, Pré Taman, Prés de la Geaide, Prés de Latour, Roda, Roly, Sablière de Nethen, Sampont, Sclaigheaux, Soëster, Tché Coquet, Terril du Gosson, Tibautienne, Tiènes de Dailly, Val de Coeurcq, Vallée de l'Almache, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de la Bellemeuse et du Mincée, Vallée de la Gueule, Vallée de la Houille, Vallée de la Hulle, Vallée de la Wimbe, Vieille Rochette, Viesville, Vis Prés

Pinthaeus sanguinipes

Asope remarquable

Rare | Observations.be

Total d'observations : 10 | Observations en 2024 : 2 | Validation : 90 %



Photo : Brigitte Van Passel

Ecologie : Zoophage qui vit sur des feuillus dans les lisières de forêt. Il se nourrit principalement de chenilles. Il a une génération par an, pond ses œufs en juin-juillet et ses larves sont observées de juin à août. Les adultes sont présents de mars à novembre, avec une activité accrue en août-septembre.

Habitats occupés : Marais boisés, aulnaies

Plantes hôtes : Aulne


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Famenne, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Hainaut, Liège, Namur

Sources des données : INaturalist, observa-

tions.be, OFFH

Première observation en : 2011 | Dernière observation en : 2024



Réserves où l'espèce a été observée (4) : Orchimont, Rechterbach, Viesville, Virelles

Podops inuncta

Podops européen

Rare | Observations.be

Total d'observations : 17 | Observations en 2024 : 10 | Validation : 82 %



Photo : Timon Boumon

Ecologie : Phytophage vivant dans des environnements variés, il est trouvable entre les herbes et les graminées. Il se nourrit principalement de Caryophyllaceae et de Poaceae, mais parfois aussi de charognes et de déjections. Il hiberne sous forme adulte et a une seule génération par an. Les adultes se reproduisent au printemps, et les larves se développent jusqu'en septembre.

Habitats occupés : Prairies humides même submersibles, bords de cours d'eau, mais aussi milieux herbacés moussus et même secs


Plantes hôtes : Genres *Cerastium*, *Arenaria*, *Thymus*, *Artemisia*, *Ranunculus*, *Agrostis*

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : observations.be, OFFH

Première observation en : 2004 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (9) : Argilières de Romedenne, Breuvanne, Devant-Bouvignes, La Falie, Le Baquet, Les Briqueteries de Rome, Sablière de Nethen, Soëster, Tiènes de Dailly

Rhacognathus punctatus

Asope ponctué

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 14 | Observations en 2024 : 1 | Validation : 93 %




Photo : Pieterjan Vervecken

Ecologie : Zoophage vivant principalement dans les bruyères, où il se nourrit de larves de divers insectes, notamment les chrysomèles et les charançons, particulièrement après des infestations de *Lochmaea suturalis*. Il hiverne sous forme adulte et a une génération annuelle. Les œufs sont pondus au printemps et les larves sont présentes en été, avec des adultes observés de mars à octobre.

Habitats occupés : Landes à bruyères

Plantes hôtes : /


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Famenne, Lorraine

Provinces où l'espèce a été observée : Hainaut,

Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : observations.be, OFFH

Première observation en : 2003 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (8) : Chi Fontaine, Ensebach-Our, Marais de Vance, Matagne, Roda, Ru des Fagnes, Ry de Bîve, Virelles

Rhaphigaster nebulosa

Pentatome nébuleuse

Commun | Observations.be

Total d'observations : 193 | Observations en 2024 : 59 | Validation : 91 %



Photo : stanze

Ecologie : Majoritairement phytophage vivant sur une large variété de plantes dans les forêts, parcs et jardins urbains. Elle hiverne dans des endroits abrités avec une génération annuelle. Les larves apparaissent de mai à octobre, et les adultes sont présents toute l'année. L'espèce effectue une grande activité de vol entre les sites d'hivernage et est souvent retrouvée dans les maisons.

Habitats occupés : Toutes forêts feuillues chaudes comme fraîches, y compris en zones périurbaines

Plantes hôtes : Chênes, hêtres, bouleaux, noisetier, peuplier, sorbiers saules ...


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne,

Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2008 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (55) : Al Florée, Aux Roches, Basse Vallée du Geer, Beauregard, Biernimont, Brouhire d'Emael, Brun Chêne, Chantemelle, Coupu Tienne, Devant-Bouvignes, Dry les Wennes, Ermitage, Estinnes, Etang de Launoy, Grand Quarti, Grande Honnelle, Harchies, Haut-Geer, Haute-Sambre, Heyoule, His de Marloie, Lahage, Les Briqueteries de Rome, Les Spinets, Marais de Genneville, Marais de Grendel, Marcasse et alentours, Marionville, Matagne, Modave-Triffoy, Mont des Pins, Montagne Saint-Pierre, Plate Dessous les Monts, Pont Napoléon, Prairie du Carpu, Prélles, Roche Madoux, Roly, Sablière de Nethen, Sclaigheaux, Sébastopol, Soëster, Thier à la Tombe, Thier de Boirs, Thier du Gibet, Thieu, Val de Coeurcq, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de la Bacquelaine, Vallée de la Gulp, Vallée de la Vierre, Vallée de la Wimbe, Viesville, Virelles, Waulsort

Rubiconia intermedia

Rubiconie nordique

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 10 | Observations en 2024 : 0 | Validation : 90 %



Photo : Wim Declercq

Ecologie : Phytophage associée à l'airelle rouge dans les sous-bois. Elle hiverne à l'état adulte et produit une génération par an. En activité d'avril à novembre, les larves apparaissent en été.

Habitats occupés : Milieux pas forcément humides mais à forte pluviosité : prairies, lisières, clairières, ensoleillés ou non

Plantes hôtes : Galium, Teucrium, Stachys, Vicia, Trifolium, Calluna, Vaccinium, Filipendula, graminées


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne

Provinces où l'espèce a été observée : Liège,

Namur

Sources des données : observations.be, OFFH

Première observation en : 2014 | **Dernière observation en :** 2020



Réserves où l'espèce a été observée (5) : Basse Wimbe, Bois les Dames, Holzwarche, Orchimont, Vis Prés

Sciocoris cursitans

Sciocore coureur

Rare | Observations.be

Total d'observations : 23 | Observations en 2024 : 4 | Validation : 83 %



Photo : Johan Raes

Ecologie : Phytophage vivant dans des habitats secs et sablonneux, calcaires ou pierreux comme les dunes et les landes sèches. Elle pond ses œufs sur certaines plantes comme l'épervière et le potentille. Elle passe l'hiver à l'état adulte et présente une seule génération annuelle. Les mâles sont connus pour leur stridulation caractéristique.

Habitats occupés : Milieux bien exposés, peu végétalisés : talus, pelouses écorchées, friches, pelouses et prairies maigres

Plantes hôtes : Calluna, Dorycnium, Salvia, Herniaria


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne,

Condroz, Famenne, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2003 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (12) : Argilières de Romedenne, Grand Quarti, Haute-Sûre, Holzwarche, Ile aux Corsaires, Les Hazalles, Marcasse et alentours, Modave-Triffoy, Mont des Pins, Sclaigneaux, Soëster, Tiènes de Dailly

Sciocoris homalonotus

Grand Sciocore

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 7 | Observations en 2024 : 2 | Validation : 57 %



Photo : Philippe Deflorenne

Ecologie : Phytophage vivant au sol, surtout sur des graminées, dans des milieux ouverts et secs. Elle hiverne sous forme adulte et n'a qu'une génération annuelle. Les adultes sont visibles presque toute l'année, avec des larves présentes de l'été à l'automne.

Habitats occupés : Milieux herbeux bien exposés et drainants : pelouses, landes, friches, lisières


Plantes hôtes : Graminées ; aussi détritivore

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Hainaut, Liège, Luxembourg

Sources des données : observations.be, OFFH

Première observation en : 2012 | Dernière observation en : 2024



Réserves où l'espèce a été observée (5) : Aux Roches, Espace Tilou, Haute-Sûre, Mont des Pins, Thier de Boirs

Sehirus luctuosus

Séhire des myosotis

Rare | Observations.be

Total d'observations : 12 | Observations en 2024 : 5 | Validation : 83 %



Photo : Tim Worfolk

Ecologie : Phytophage vivant dans des biotopes chauds et secs, principalement sur des plantes de la famille des Boraginacées. Il a une génération annuelle, hiverne sous forme adulte, et est actif du printemps à l'automne, avec un pic de visibilité au printemps. Les larves apparaissent de juin à août, et la nouvelle génération devient adulte fin juillet.

Habitats occupés : Végétation herbacée en sous-bois clairs, lisières ou prairies, fraîches ou sèches, anciennes cultures


Plantes hôtes : Myosotis

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Namur

Sources des données : observations.be, OFFH

Première observation en : 2003 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (9) : Behotte, Devant-Bouvignes, Espace Tilou, Fosse aux Sables, Orchimont, Ry de Bîve, Sablière de Nethen, Soëster, Vallée de l'Eau d'Yves

Stagonomus bipunctatus

Stagonome nain

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 17 | Observations en 2024 : 2 | Validation : 71 %



Photo : Paul en Marianne

Ecologie : Phytophage qui vit dans des habitats secs et sablonneux, principalement sur la véronique officinale. Il hiverne comme adulte et se reproduit au printemps, avec des adultes visibles de mai à août.

Habitats occupés : Milieux variés ; la sous-espèce *bipunctatus* est thermophile (pelouses et landes sèches) ; la sous-espèce *pusillus* est plus forestière


Plantes hôtes : Labiacées notamment Ajuga ; aussi Teucrium et Thymus. Egaleme nt Verbena, Verbas-cum, Scrophularia, Veronica, Antirrhinum

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Hainaut, Luxembourg, Namur

Sources des données : observations.be, OFFH

Première observation en : 2003 | Dernière observation en : 2024



Réserves où l'espèce a été observée (5) : Harchies, Haute-Sûre, Lahage, Le Baquet, Sclaig-neaux

Stagonomus venustissimus

Stagonome pourpré

Relativement commun | Observations.be

Total d'observations : 56 | Observations en 2024 : 23 | Validation : 82 %



Photo : Henk Wallays

Ecologie : Phytophage vivant sur les labiées et particulièrement les épiâires dans les milieux humides, verts et herbeux. On peut le trouver au niveau des marais, tourbières, bords d'étangs et de cours d'eau, landes humides, prairies hygrophiles, lisières forestières et dans les jardins. Il y a une génération annuelle et il est observable de fin avril à octobre, avec un pic en mai-juin et un autre en août.

Habitats occupés : Sous-bois herbeux, clairières, lisières et prairies fraîches voire humides, orties.

Plantes hôtes : Lamiées dont les Stachys, Ballota, Clinopodium, Galeopsis, Lamium, Marrubium.


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne,

Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 1983 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (31) : Basse Semois orientale, Biron, Bois de Waderngnes, Comblinay, Devant-Bouvignes, Estinnes, Etang de Launoy, Feschaux, Fosse aux Sables, Fouches, Grand Quarti, Harchies, Haute-Sambre, Herbet et Ravenne, L'Escaille, Lahage, Le Baquet, Marais de Genneville, Marais de la Cussignière, Modave-Triffroy, Montagne Saint-Pierre, Orchimont, Pré du Duc, Sclaigneaux, Val de Coeurcq, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de la Houille, Vallée de la Vierre, Vallée de la Wimbe, Virelles, Waulsort

Thyreocoris scarabaeoides

Thyréocore scarabée

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 2 | Observations en 2024 : 0 | Validation : 100 %



Photo : Michal Górski

Ecologie : Phytophage vivant aux racines de violettes dans des sols secs ou calcaires. Il a une génération annuelle, hiverne sous forme adulte, et les adultes sont actifs de janvier à septembre, avec un pic de visibilité en mai-juin. La nouvelle génération devient adulte fin juillet.

Habitats occupés : Au sol sur des pelouses sèches, landes avec affleurements rocheux


Plantes hôtes : Renoncules, violettes

Ecorégions où l'espèce a été observée : Famenne

Provinces où l'espèce a été observée : Luxembourg

Sources des données : observations.be

Première observation en : 2018 | Dernière observation en : 2023



Réserves où l'espèce a été observée (2) : Les Briqueteries de Rome, Sarts du Crep

Tritomegas bicolor

Tritomège bicolore

Commun | Observations.be

Total d'observations : 53 | Observations en 2024 : 18 | Validation : 92 %



Photo : Jonas Ghyselen

Ecologie : Phytophage vivant sur des plantes de la famille des Lamiacées, surtout dans des habitats partiellement ombragés. Il a une génération annuelle, hiverne sous forme adulte et pond ses œufs en mai. Les larves sont observées de mai à septembre, et les adultes sont présents toute l'année, avec un pic de visibilité au printemps.

Habitats occupés : Espèce d'ombre : lisières, sous-bois, talus ombragés, même rudéraux

Plantes hôtes : Labiées : *Lamium album* et *purpureum*, *Stachys sylvatica* et *palustris*, *Ballota nigra*


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et

Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2009 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (26) : Abattis, Aux Roches, Aux sources de la Jette, Behotte, Devant-Bouvignes, Emmels, Ermitage, Grande Honnelle, Harchies, Haut-Geer, Haute-Sûre, Holzwarche, L'Escaille, Marionville, Modave-Triffois, Mont des Pins, Sclaingneaux, Thieu, Tiènes de Dailly, Val de Coeurcq, Vallée de l'Eau d'Yves, Vallée de la Bacquelaine, Vallée de la Gueule, Vallée de la Gulp, Virelles, Vis Prés

Tritomegas sexmaculatus

Tritomègue des marrubes

Très rare | Observations.be

Total d'observations : 12 | Observations en 2024 : 3 | Validation : 92 %



Photo : Henk Wallays

Ecologie : Phytophage vivant principalement dans les zones sèches et rudérales. Il a une génération annuelle, hiverne sous forme adulte, et les larves sont présentes en mai et août. Les adultes apparaissent en mai-juin et août-septembre.

Habitats occupés : Divers milieux plutôt bien exposés : lisières, friches, bords de routes ...

Plantes hôtes : Labiées (Marrubium, Calamitha, Mentha, Lamium, Ballota) ; aussi pariétaires, orties, armoise, Chenopodium vulgare, et aubépine en fleurs


Ecorégions où l'espèce a été observée : Condroz, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Hainaut,

Liège, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be

Première observation en : 2015 | Dernière observation en : 2024



Réserves où l'espèce a été observée (3) : Harchies, Montagne Saint-Pierre, Sclaigneaux

Troilus luridus

Asope blafard

Rare | Observations.be

Total d'observations : 30 | Observations en 2024 : 2 | Validation : 100 %



Photo : Roeland Libeer

Ecologie : Prédateur zoophage vivant sur des arbres feuillus et résineux dans divers habitats forestiers. Il se nourrit d'insectes variés, avec un premier stade larvaire phytophage. Il hiberne en tant qu'adulte et a une génération par an. Les œufs sont déposés en paquets, et les larves sont observées entre juin et octobre. Les adultes sont présents toute l'année, avec des pics en printemps et en automne.

Habitats occupés : Bois et lisières frais, mixtes ou résineux, et abords humides, marais et tourbières

Plantes hôtes : /


Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et

Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : observations.be, OFFH

Première observation en : 2001 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (17) : Basse Wimbe, Bois les Dames, Commanster, Etang de Launoy, Grand Quarti, Grande Honnelle, Harchies, Heinsch, Lahage, Marcasse et alentours, Mont des Pins, Orchimont, Pont Napoléon, Roche Madoux, Ry de Bîve, Virelles, Vis Prés

Zicrona caerulea

Asope bleu-vert

Relativement commun | Observations.be

Total d'observations : 54 | Observations en 2024 : 5 | Validation : 98 %



Photo : Mireille Henry

Ecologie : Zoophage vivant dans des végétations basses, souvent dans des landes, et se nourrissant principalement des larves de petits coléoptères. Elle hiverne sous forme adulte et a une génération par an, avec des œufs pondus à partir de mai. Les adultes sont actifs de février à novembre, avec des pics au printemps et en été.

Habitats occupés : Milieux plutôt frais voire humides : lisières, landes, prairies hautes ...


Plantes hôtes : /

Ecorégions où l'espèce a été observée : Ardenne, Condroz, Famenne, Lorraine, Nord sillon Sambre et Meuse

Provinces où l'espèce a été observée : Brabant Wallon, Bruxelles, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur

Sources des données : INaturalist, observations.be, OFFH

Première observation en : 2002 | **Dernière observation en :** 2024



Réserves où l'espèce a été observée (37) : Abattis, Biron, Bois les Dames, Bourcy, Breuvanne, Chantemelle, Chi Fontaine, Deux-Ourthes, Emmels, Fouches, Graide, Grand Quarti, Heinsch, Holzwarche, Ile aux Corsaires, L'Escaille, Les Briqueteries de Rome, Les Crayaux, Les Sept Fontaines, Marais de Genneville, Marais de Grendel, Prairie du Carpu, Pré du Duc, Pré Taman, Roda, Roselière de Neerpède, Ruisseau de la Jonquière, Ry de Bive, Sampont, Thieu, Val de Coeurcq, Vallée de la Hulle, Vallée de la Vierre, Vallée des Aleines, Vellereux, Virelles, Vis Prés

ANNEXE 1 : Liste d'espèces par réserve

Abattis | 14 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	1	0
<i>Aelia acuminata</i>	2	1	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	1
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	11	3	0
<i>Elasmostethus interstinctus</i>	0	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	2	2
<i>Eurygaster testudinaria</i>	3	2	1
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	3	4	1
<i>Palomena prasina</i>	0	3	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	2	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	1	0	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	0

Adrets de Romont | 5 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	2	0
<i>Eurydema dominulus</i>	2	2	0
<i>Eurydema oleracea</i>	1	2	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	2	0

Al Florée | 16 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	1	1
<i>Aelia acuminata</i>	0	5	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	7	8	2
<i>Dolycoris baccarum</i>	2	3	1
<i>Elasmucha grisea</i>	0	0	1
<i>Eurydema dominulus</i>	2	4	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	2	1
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	1	1
<i>Graphosoma italicum</i>	2	6	0
<i>Legnotus limbosus</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	5	3	1
<i>Peribalus strictus</i>	1	1	0
<i>Picromerus bidens</i>	1	1	1
<i>Piezodorus lituratus</i>	2	2	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	1	0	0

Argilières de Romedenne | 16 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	0	1
<i>Aelia acuminata</i>	1	0	1
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	4	1
<i>Coptosoma scutellatum</i>	0	1	1
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	2	1

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Eurydema dominulus</i>	0	0	1
<i>Eurydema oleracea</i>	0	0	1
<i>Eurygaster maura</i>	0	0	1
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	0	2
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	0	2
<i>Graphosoma italicum</i>	0	5	1
<i>Palomena prasina</i>	1	0	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	1
<i>Picromerus bidens</i>	0	0	1
<i>Podops inuncta</i>	0	1	1
<i>Sciocoris cursitans</i>	0	1	1

Aux Roches | 27 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	1	3
<i>Aelia acuminata</i>	1	1	3
<i>Arma custos</i>	0	2	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	2	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	9	1
<i>Coptosoma scutellatum</i>	0	2	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	8	7
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	0	1	0
<i>Elasmucha grisea</i>	2	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	1	3	3
<i>Eurydema ornata</i>	1	0	0
<i>Eurygaster maura</i>	0	0	1

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	5	4
<i>Graphosoma italicum</i>	3	14	14
<i>Halyomorpha halys</i>	2	1	0
<i>Holcostethus sphacelatus</i>	0	1	4
<i>Legnotus limbosus</i>	0	0	1
<i>Legnotus picipes</i>	0	0	1
<i>Neottiglossa pusilla</i>	0	0	1
<i>Nezara viridula</i>	3	1	0
<i>Palomena prasina</i>	5	12	2
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	4	1
<i>Peribalus strictus</i>	1	2	4
<i>Piezodorus lituratus</i>	1	2	2
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	2	4
<i>Sciocoris homalonotus</i>	0	0	3
<i>Tritomegas bicolor</i>	1	2	1

Aux sources de la Jette | 5 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	2	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	0	1	0

Basse Nimelette | 8 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Cyphostethus tristriatus</i>	0	1	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	2	0
<i>Elasmucha grisea</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0

Basse Semois occidentale | 11 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	1	0
<i>Aelia acuminata</i>	0	6	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	4	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	5	0
<i>Eurydema dominulus</i>	3	3	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	4	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	4	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	3	0
<i>Neottiglossa pusilla</i>	0	10	0
<i>Palomena prasina</i>	0	11	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	6	0

Basse Semois orientale | 11 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	1	0	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	1	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Coptosoma scutellatum</i>	0	2	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	1	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	5	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	0	1	0

Basse Vallée du Geer | 11 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	4	0	0
<i>Aelia acuminata</i>	1	0	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	4	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	2	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	4	5	0
<i>Halyomorpha halys</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	8	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	5	0	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	1	0	0

Basse Wimbe | 15 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	1	0	0
<i>Aelia acuminata</i>	2	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	2	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	10	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	0	1	0
<i>Elasmucha grisea</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	1	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	3	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	6	0
<i>Legnotus limbosus</i>	3	0	0
<i>Palomena prasina</i>	2	2	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	2	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	1	0
<i>Rubiconia intermedia</i>	0	5	0
<i>Troilus luridus</i>	0	2	0

Beaulieu | 9 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	1	0	0
<i>Aelia acuminata</i>	1	0	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	3	0	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	5	0	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	4	0	0
<i>Elasmotethus minor</i>	1	0	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Graphosoma italicum</i>	11	1	0
<i>Palomena prasina</i>	10	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	0	0

Beauregard | 10 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	1	0
<i>Aelia acuminata</i>	1	0	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	0	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Elasmucha grisea</i>	0	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	2	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	2	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	1	0

Bec du Feyi | 9 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	2	9	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	3	1
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	3	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	2	0
<i>Palomena prasina</i>	1	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	3	0

Behotte | 13 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	1	0	0
<i>Aelia acuminata</i>	10	3	1
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	4	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	3	3
<i>Eurydema oleracea</i>	4	1	0
<i>Eurygaster maura</i>	2	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	4	0	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	2	3	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	1	0
<i>Legnotus limbosus</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	1
<i>Sehirus luctuosus</i>	1	0	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	1	1	0

Bergerie Epipactis | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0

Biernimont | 7 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	2	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	2	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	1	0

Biron | 16 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	3	0	0
<i>Aelia acuminata</i>	7	4	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	3	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	17	6	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	4	2	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	2	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	20	5	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	3	3	0
<i>Graphosoma italicum</i>	5	8	0
<i>Legnotus limbosus</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	26	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	1	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	2	0	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	1	0	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	0

Boiron | 11 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	0	1	1
<i>Eurydema dominulus</i>	1	0	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	0	1
<i>Piezodorus lituratus</i>	1	0	0

Bois de Wadergnies | 11 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	3	0	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	10	0	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	5	0	0
<i>Eurydema dominulus</i>	2	0	0
<i>Eurydema oleracea</i>	4	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	0	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	2	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	12	0	0
<i>Palomena prasina</i>	6	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	2	0	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	1	0	0

Bois de la Drève | 5 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	2	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	2	0

Bois des Fourneaux | 3 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	1	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	0

Bois des Vallées | 3 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	3	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	2	1	0

Bois du Fil Maillet | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0

Bois les Dames | 15 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	0	1
<i>Aelia acuminata</i>	0	2	3

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Arma custos</i>	0	0	1
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	3
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	0	1	3
<i>Elasmucha grisea</i>	0	2	1
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	5
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	2	3
<i>Neottiglossa pusilla</i>	0	1	7
<i>Palomena prasina</i>	0	9	19
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	14	20
<i>Peribalus strictus</i>	0	0	5
<i>Rubiconia intermedia</i>	0	0	2
<i>Troilus luridus</i>	0	4	2
<i>Zicrona caerulea</i>	0	0	1

Bondezaie | 4 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	1	0	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	2	0	0

Bourcy | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	0	1	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	0

Braunlauf | 5 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	2	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	2	0
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	1	0

Breuvanne | 11 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	2	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	4	1
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Eurydema ornata</i>	0	0	2
<i>Eurygaster maura</i>	0	0	1
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	2	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0
<i>Podops inuncta</i>	1	0	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	0

Brouhire d'Emael | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Graphosoma italicum</i>	0	2	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	1	0

Brun Chêne | 15 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	4	0
<i>Aelia acuminata</i>	2	2	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	5	4	0
<i>Coptosoma scutellatum</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	5	3	0
<i>Elasmotherus interstinctus</i>	1	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	2	0
<i>Graphosoma italicum</i>	2	0	0
<i>Palomena prasina</i>	2	2	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	5	2	0
<i>Peribalus strictus</i>	2	0	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	2	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	2	1	0

Bruyère Mathias | 4 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Elasmotherus interstinctus</i>	1	0	0
<i>Elasmucha grisea</i>	1	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	2	1	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	1	0	0

Carrière Hannotelet | 7 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	3	0	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	3	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	2	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	0	0
<i>Legnotus limbosus</i>	0	3	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	2	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	2	0	0

Carrière d'Evieux | 12 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	2	0	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	1	0
<i>Carpocoris</i> sp.	0	1	0
<i>Coptosoma scutellatum</i>	1	0	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	4	6	0
<i>Eurydema oleracea</i>	2	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	0	0
<i>Holcostethus sphacelatus</i>	1	2	0
<i>Legnotus limbosus</i>	3	1	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	2	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	1	1	0

Caves Paheau | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Eurydema oleracea</i>	0	0	1

Champs de Neutremont | 3 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	0
<i>Picromerus bidens</i>	1	0	0

Chantemelle | 18 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	7	0	1
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	4	11	1
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	4	1
<i>Elasmostethus interstinctus</i>	1	4	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	4	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	0	1
<i>Eurygaster maura</i>	0	0	1
<i>Eurygaster testudinaria</i>	19	0	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	6	2	0
<i>Graphosoma italicum</i>	2	7	0
<i>Odontoscelis fuliginosa</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	6	0	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	2	0	0
<i>Peribalus strictus</i>	1	0	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	0	1
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	2	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	1	0	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	0

Chayneux | 11 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	1	1	1
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	3	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	1
<i>Eurydema oleracea</i>	1	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	2	0	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	0	1
<i>Graphosoma italicum</i>	0	2	0
<i>Holcostethus sphacelatus</i>	0	0	1
<i>Neottiglossa pusilla</i>	0	2	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	1	0	1

Chenogne | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0

Chi Fontaine | 10 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	2	0
<i>Elasmucha grisea</i>	0	2	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	3	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	1	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Rhacognathus punctatus</i>	0	2	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	0

Coin de Suzin | 6 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	2	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	2	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	2	0	0

Comblinay | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Holcostethus sphacelatus</i>	0	0	1
<i>Stagonomus venustissimus</i>	2	0	0

Commanster | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Troilus luridus</i>	1	0	0

Comogne | 7 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	4	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	0	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	2	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Eurydema ornata</i>	1	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	1	0

Coteau de Mont | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0

Coteau de Warre | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	0	0

Coteaux de Wespín | 11 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	0	3
<i>Arma custos</i>	0	0	1
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	0	2
<i>Coptosoma scutellatum</i>	0	0	2
<i>Eurydema oleracea</i>	0	0	1
<i>Eurygaster maura</i>	0	0	2
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	0	1
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	0	1
<i>Neottiglossa pusilla</i>	0	0	1
<i>Palomena prasina</i>	0	1	1
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	0	1

Coupu Tienne | 8 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	1	1
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	0	1
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	11	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	1	1
<i>Eurydema oleracea</i>	0	2	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	7	0
<i>Palomena prasina</i>	0	0	1
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	1	0

Cowan | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0

Derrière Vesin | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Coptosoma scutellatum</i>	1	0	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	1	0

Derrière chez Mélanie | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	3	0

Deux-Ourthes | 7 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	1	0	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	0	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Elasmostethus interstinctus</i>	2	0	0
<i>Palomena prasina</i>	13	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	0	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	2	0	0
<i>Zicrona caerulea</i>	1	0	0

Devant-Bouvignes | 30 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	1	1	0
<i>Aelia acuminata</i>	4	7	4
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	17	4
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	5	26	6
<i>Coptosoma scutellatum</i>	0	2	2
<i>Dolycoris baccarum</i>	5	17	7
<i>Elasmostethus interstinctus</i>	1	4	3
<i>Elasmostethus minor</i>	1	1	4
<i>Elasmucha grisea</i>	1	0	2
<i>Eurydema oleracea</i>	2	8	2
<i>Eurydema ornata</i>	4	3	0
<i>Eurygaster austriaca</i>	1	0	1
<i>Eurygaster maura</i>	2	2	3
<i>Eurygaster testudinaria</i>	4	6	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	7	31	7
<i>Holcostethus sphacelatus</i>	0	0	1
<i>Legnotus limbosus</i>	1	1	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Neottiglossa pusilla</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	6	16	6
<i>Palomena viridissima</i>	0	0	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	3	1
<i>Peribalus strictus</i>	1	4	6
<i>Picromerus bidens</i>	0	2	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	2	2	5
<i>Podops inuncta</i>	0	0	1
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	3	9	2
<i>Sehirus luctuosus</i>	0	2	2
<i>Stagonomus venustissimus</i>	2	0	1
<i>Tritomegas bicolor</i>	0	3	0

Dry les Wennes | 12 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	1	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	2	0
<i>Coptosoma scutellatum</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	2	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	3	4	0
<i>Holcogaster fibulata</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	2	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	1	0	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	1	0

Emmels | 16 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	1	1	0
<i>Aelia acuminata</i>	1	0	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	2	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	2	1
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	2	0	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	1	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	8	10	0
<i>Legnotus limbosus</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	1	2	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	2	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	0	1	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	0

Ennal | 4 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	1	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	1	1	0

Enneilles | 12 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	0	1
<i>Aelia acuminata</i>	1	0	2
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	0	3
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	1
<i>Eurydema ornata</i>	0	0	1
<i>Eurygaster maura</i>	0	0	1
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	7	5
<i>Neottiglossa pusilla</i>	1	0	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	1	0	1

Ensebach-Our | 6 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	2	0
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Rhacognathus punctatus</i>	0	4	0

Ermitage | 9 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	1	0	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	2	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	1	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	1	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	0	2	0

Espace Tilou | 12 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	3	0	0
<i>Elasmostethus interstinctus</i>	3	0	0
<i>Elasmucha grisea</i>	0	1	0
<i>Eurydema ornata</i>	1	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	1	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	4	4	0
<i>Peribalus strictus</i>	1	0	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	1	1	0
<i>Sciocoris homalonotus</i>	1	0	0
<i>Sehirus luctuosus</i>	1	0	0

Estinnes | 3 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	1	0	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	1	0	0

Etang de Launoy | 14 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	2	3	0
<i>Aelia acuminata</i>	0	1	0
<i>Arma custos</i>	1	2	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	0	6	0
<i>Elasmucha grisea</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	2	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	3	0
<i>Palomena prasina</i>	1	2	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	6	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	1	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	0	2	0
<i>Troilus luridus</i>	0	1	0

Etang des Canes | 6 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	0	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	0	0
<i>Elasmucha grisea</i>	1	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	0	0

Feschaux | 4 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	3	0
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	0	1	0

Fosse aux Sables | 5 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	2	0	0
<i>Peribalus strictus</i>	3	0	1
<i>Sehirus luctuosus</i>	1	0	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	2	0	0

Fouches | 22 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	2	0	0
<i>Aelia acuminata</i>	5	4	0
<i>Arma custos</i>	0	1	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	1	4	1
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	4	4	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	5	4	3
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	0	2	0
<i>Eurydema dominulus</i>	7	3	0
<i>Eurydema oleracea</i>	5	1	2
<i>Eurydema ornata</i>	0	0	1
<i>Eurygaster maura</i>	0	0	1
<i>Eurygaster testudinaria</i>	2	3	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	1	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	15	8	0
<i>Legnotus limbosus</i>	0	1	0
<i>Neottiglossa leporina</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	4	2	1
<i>Peribalus strictus</i>	0	3	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	1	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	1	2	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	2	0	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	1

Fourchinée | 11 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	3	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	1	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	0	1	0
<i>Eurygaster austriaca</i>	0	2	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	1	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Graphosoma italicum</i>	2	2	0
<i>Palomena prasina</i>	0	2	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	2	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	1	0

Gerard & Francis Paquay (Quatre-Vents) | 8 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	2	0	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	0	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	2	0	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	1	0	0
<i>Elasmucha grisea</i>	0	2	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	1	0	0

Glain | 7 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	2	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	3	0
<i>Palomena prasina</i>	0	2	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0

Graide | 5 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	1
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Neottiglossa pusilla</i>	0	1	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	1	1
<i>Zicrona caerulea</i>	0	2	0

Grand Quarti | 26 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	1	2	0
<i>Aelia acuminata</i>	0	3	8
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	3	5
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	2	9	11
<i>Coptosoma scutellatum</i>	0	0	5
<i>Cyphostethus tristriatus</i>	0	0	1
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	12
<i>Elasmostethus interstinctus</i>	0	1	1
<i>Elasmucha fieberi</i>	0	0	1
<i>Eurydema dominulus</i>	0	4	7
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	3
<i>Eurygaster maura</i>	0	0	3
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	3	3
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	0	2
<i>Graphosoma italicum</i>	0	7	8
<i>Neottiglossa pusilla</i>	0	0	2
<i>Palomena prasina</i>	1	5	6

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	1
<i>Peribalus strictus</i>	0	0	3
<i>Picromerus bidens</i>	0	3	2
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	2	5
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	1	2
<i>Sciocoris cursitans</i>	0	0	1
<i>Stagonomus venustissimus</i>	0	0	3
<i>Troilus luridus</i>	0	0	2
<i>Zicrona caerulea</i>	0	0	1

Grande Honnelle | 10 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	0	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	0	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	0	1
<i>Graphosoma italicum</i>	1	0	1
<i>Legnotus limbosus</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	2	2
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	0	1
<i>Tritomegas bicolor</i>	0	1	0
<i>Troilus luridus</i>	0	0	1

Großweberbach | 7 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	1	0	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	2	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	2	0
<i>Eurydema dominulus</i>	1	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	1	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0

Haie Gabaux | 11 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	1	0	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	1	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	6	1
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	1	2
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	1	0	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	1	1
<i>Graphosoma italicum</i>	0	2	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	0	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	0	1

Harchies | 25 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	6	1	5
<i>Aelia acuminata</i>	2	8	1
<i>Arma custos</i>	0	2	4
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Coptosoma scutellatum</i>	0	3	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	3	9	10
<i>Dyroderes umbraculatus</i>	15	4	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	5	16	3
<i>Elasmucha grisea</i>	13	28	5
<i>Eurydema oleracea</i>	0	6	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	7	3	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	0	1
<i>Graphosoma italicum</i>	81	95	10
<i>Legnotus limbosus</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	19	45	5
<i>Pentatoma rufipes</i>	5	18	3
<i>Peribalus strictus</i>	1	1	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	1	1
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	2	1
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	5	25	9
<i>Stagonomus bipunctatus</i>	0	1	1
<i>Stagonomus venustissimus</i>	0	1	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	3	7	0
<i>Tritomegas sexmaculatus</i>	1	1	0
<i>Troilus luridus</i>	1	1	1

Haut-Geer | 12 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	1	1	0
<i>Aelia acuminata</i>	0	1	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	4	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	3	2	0
<i>Halyomorpha halys</i>	4	0	0
<i>Nezara viridula</i>	3	0	0
<i>Palomena prasina</i>	3	4	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	2	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	6	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	1	1	0

Haute-Sambre | 16 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	2	0
<i>Aelia acuminata</i>	2	0	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	0	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	4	0
<i>Elasmotherus minor</i>	0	1	0
<i>Elasmucha grisea</i>	0	2	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	3	1	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	2	0
<i>Palomena prasina</i>	1	1	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Picromerus bidens</i>	0	2	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	1	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	1	2	0

Haute-Sûre | 23 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	2	0	0
<i>Aelia acuminata</i>	10	1	0
<i>Aelia klugii</i>	0	7	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	2
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	2	7	2
<i>Dolycoris baccarum</i>	8	6	1
<i>Elasmucha grisea</i>	4	0	0
<i>Eurydema dominulus</i>	2	12	2
<i>Eurydema oleracea</i>	0	3	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	2	2
<i>Eysarcoris aeneus</i>	3	3	0
<i>Graphosoma italicum</i>	11	8	0
<i>Legnotus picipes</i>	0	3	0
<i>Neottiglossa pusilla</i>	3	3	1
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	7	5	0
<i>Peribalus strictus</i>	3	1	0
<i>Picromerus bidens</i>	1	3	1
<i>Piezodorus lituratus</i>	6	4	0
<i>Sciocoris cursitans</i>	0	2	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Sciocoris homalonotus</i>	0	1	0
<i>Stagonomus bipunctatus</i>	0	8	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	1	0	0

Heinsch | 19 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	1	0	0
<i>Aelia acuminata</i>	4	0	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	3	3	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	3	2	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	0	2	0
<i>Elasmucha grisea</i>	0	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	2	2	0
<i>Eurydema ornata</i>	1	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	4	3	0
<i>Neottiglossa leporina</i>	2	0	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	0
<i>Palomena viridissima</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	0	0
<i>Peribalus strictus</i>	3	2	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	4	0	0
<i>Troilus luridus</i>	0	1	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	0

Herbet et Ravenne | 15 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	6	0	2
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	1	0	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	6	0	1
<i>Dolycoris baccarum</i>	5	1	2
<i>Eurydema oleracea</i>	3	0	2
<i>Eurydema ornata</i>	1	0	0
<i>Eurygaster maura</i>	0	0	1
<i>Eurygaster testudinaria</i>	3	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	4	7	2
<i>Legnotus limbosus</i>	3	0	0
<i>Neottiglossa pusilla</i>	2	0	0
<i>Palomena prasina</i>	3	0	0
<i>Peribalus strictus</i>	4	0	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	3	0	1
<i>Stagonomus venustissimus</i>	2	0	0

Heyoule | 9 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	1	2	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	4	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Elasmucha grisea</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	2	0
<i>Graphosoma italicum</i>	4	10	0
<i>Odontoscelis fuliginosa</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	2	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	2	0

His de Marloie | 6 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	3	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	0	0
<i>Legnotus limbosus</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	3	0	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	1	0	0

Holzwarche | 20 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	4	1	0
<i>Canthophorus impressus</i>	0	6	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	8	15	0
<i>Elasmostethus interstinctus</i>	2	0	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	8	1
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	20	20	0
<i>Neottiglossa pusilla</i>	2	4	0
<i>Palomena prasina</i>	0	2	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0
<i>Peribalus strictus</i>	1	1	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Picromerus bidens</i>	0	2	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	12	0
<i>Rubiconia intermedia</i>	0	1	0
<i>Sciocoris cursitans</i>	0	2	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	0	1	1
<i>Zicrona caerulea</i>	0	3	0

Housta | 3 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	2	0	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	4	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	0	0

Ile aux Corsaires | 7 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Elasmucha grisea</i>	0	1	2
<i>Graphosoma italicum</i>	1	0	0
<i>Legnotus limbosus</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	4	3
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	0	2
<i>Sciocoris cursitans</i>	0	1	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	0	1

Kolvenderbach | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Graphosoma italicum</i>	2	0	0

L'Escaille | 13 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	0	1
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	3	0
<i>Dyroderes umbraculatus</i>	1	0	0
<i>Elasmostethus interstinctus</i>	0	0	1
<i>Elasmucha grisea</i>	0	2	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	6	0
<i>Palomena prasina</i>	1	3	1
<i>Peribalus strictus</i>	0	2	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	0	2	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	1	0	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	0

La Falie | 5 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	1	0	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	2	0	0
<i>Eurydema oleracea</i>	1	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	3	0
<i>Podops inuncta</i>	1	0	0

La Goutelle | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0

La Motte du Brabant | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Peribalus strictus</i>	1	0	0

La Picherotte | 7 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	1
<i>Eurydema dominulus</i>	0	3	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	1	2
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0

La Prée | 8 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	4	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	2	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	6	0
<i>Palomena prasina</i>	0	2	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	2	0

Lahage | 20 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	8	1	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	4	3	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	3	0	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	10	6	0
<i>Eurydema dominulus</i>	1	0	0
<i>Eurydema oleracea</i>	3	2	0
<i>Eurydema ornata</i>	2	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	10	0	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	2	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	4	0	0
<i>Legnotus picipes</i>	1	0	0
<i>Neottiglossa pusilla</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	13	4	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	2	0	0
<i>Peribalus strictus</i>	1	0	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	20	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	1	0	0
<i>Stagonomus bipunctatus</i>	2	0	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	5	1	0
<i>Troilus luridus</i>	0	0	1

Lande du Chaineux | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0

Lavaselle | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0

Lavaux-Sainte-Anne | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	2	0	0

Le Baquet | 22 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	1	0
<i>Aelia acuminata</i>	0	2	4
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	4	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	2	11	11
<i>Coptosoma scutellatum</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	2	8
<i>Elasmostethus interstinctus</i>	0	1	1
<i>Elasmucha grisea</i>	0	1	3
<i>Eurydema oleracea</i>	5	1	5
<i>Eurygaster maura</i>	0	0	2
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	4	5
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	1	3
<i>Graphosoma italicum</i>	8	13	5
<i>Legnotus limbosus</i>	0	0	2
<i>Palomena prasina</i>	3	5	5
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	3	3
<i>Peribalus strictus</i>	3	1	1
<i>Picromerus bidens</i>	0	0	1
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	1	1
<i>Podops inuncta</i>	0	0	1
<i>Stagonomus bipunctatus</i>	0	0	4

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Stagonomus venustissimus</i>	0	0	1

Les Briqueteries de Rome | 22 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	0	1
<i>Aelia acuminata</i>	1	4	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	1	0	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	4	3
<i>Coptosoma scutellatum</i>	1	5	1
<i>Dolycoris baccarum</i>	2	5	1
<i>Eurydema dominulus</i>	1	2	0
<i>Eurydema oleracea</i>	3	1	0
<i>Eurygaster maura</i>	1	0	1
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	4	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	3	0	1
<i>Graphosoma italicum</i>	1	9	3
<i>Legnotus limbosus</i>	0	2	0
<i>Neottiglossa pusilla</i>	2	2	0
<i>Palomena prasina</i>	2	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	4	2	0
<i>Podops inuncta</i>	0	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	2	0	0
<i>Thyreocoris scarabaeoides</i>	0	1	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	0

Les Bulles | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	0	2
<i>Palomena prasina</i>	0	0	2

Les Burettes | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	0	1

Les Crayaux | 7 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	2	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	0	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	1	0	0
<i>Zicrona caerulea</i>	1	0	0

Les Glawans | 4 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	2	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	0

Les Hazalles | 17 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	1	0	0
<i>Aelia acuminata</i>	4	2	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	3	0	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	8	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	2	7	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	2	0
<i>Eurydema oleracea</i>	5	2	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	4	4	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	1	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	10	6	0
<i>Legnotus limbosus</i>	1	0	0
<i>Neottiglossa pusilla</i>	3	0	0
<i>Palomena prasina</i>	5	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	2	0	0
<i>Peribalus strictus</i>	1	2	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	4	1	0
<i>Sciocoris cursitans</i>	1	0	0

Les Hys | 6 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	5	0	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	21	0	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Pentatoma rufipes</i>	2	0	0
<i>Peribalus strictus</i>	1	0	0

Les Sept Fontaines | 5 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	2	0	0
<i>Palomena prasina</i>	0	2	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	3	0

Les Spinets | 13 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	10	3	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	8	2	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	6	1	1
<i>Elasmucha grisea</i>	7	0	0
<i>Eurydema oleracea</i>	13	0	0
<i>Eurygaster maura</i>	1	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	7	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	5	1	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	1
<i>Peribalus strictus</i>	8	1	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	1	0	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	9	0	0

Les Truchettes | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	0	1
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0

Longlier | 5 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	2	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	2	0
<i>Palomena prasina</i>	0	2	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	2	0

Mandebras | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0

Marais Chapelle | 4 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dyrodere umbraculatus</i>	2	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	2	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	0	0

Marais Saint-Jean | 3 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dyrodere umbraculatus</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	0	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	2	0

Marais de Genneville | 9 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	1	1
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	0	1
<i>Graphosoma italicum</i>	0	0	1
<i>Palomena prasina</i>	1	1	1
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	0	1
<i>Stagonomus venustissimus</i>	0	0	1
<i>Zicrona caerulea</i>	0	0	1

Marais de Grendel | 6 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	2	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	0	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	1	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	0

Marais de Vance | 16 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	1	4	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	2	1
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	2	4	1

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	1	3	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	4	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	1	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	5	5	1
<i>Neottiglossa pusilla</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	1	1	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	4	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	2	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	1	4	0
<i>Rhacognathus punctatus</i>	0	1	0

Marais de la Cussignière | 5 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Arma custos</i>	0	1	0
<i>Elasmucha grisea</i>	1	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	2	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	1	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	0	1	0

Marais de la Vire | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	1	0

Marcasse et alentours | 21 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	1	2	0
<i>Aelia acuminata</i>	7	2	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	1	3	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	2	4	0
<i>Coptosoma scutellatum</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	3	3	0
<i>Dyroderes umbraculatus</i>	0	1	0
<i>Elasmostethus interstinctus</i>	4	1	0
<i>Elasmucha grisea</i>	2	0	0
<i>Eurydema ornata</i>	0	1	0
<i>Eurygaster austriaca</i>	2	0	0
<i>Eurygaster maura</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	2	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	6	2	1
<i>Palomena prasina</i>	5	1	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	1	0
<i>Peribalus strictus</i>	4	0	1
<i>Piezodorus lituratus</i>	3	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	2	1	0
<i>Sciocoris cursitans</i>	0	1	0
<i>Troilus luridus</i>	0	1	0

Mariembourg | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Graphosoma italicum</i>	0	2	0

Marionville | 14 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	0	2
<i>Aelia acuminata</i>	1	0	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	0	1
<i>Dolycoris baccarum</i>	3	2	0
<i>Dyroderes umbraculatus</i>	2	0	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	3	0	0
<i>Elasmucha grisea</i>	5	0	0
<i>Eurydema oleracea</i>	1	1	1
<i>Graphosoma italicum</i>	2	0	0
<i>Palomena prasina</i>	3	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	2	0	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	1	3	1
<i>Tritomegas bicolor</i>	0	1	0

Matagne | 15 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	0	1
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	3	1
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	0	0	1
<i>Eurydema dominulus</i>	0	0	1
<i>Eurydema oleracea</i>	0	0	1
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	3	1
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	1	1

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Palomena prasina</i>	1	1	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0
<i>Peribalus strictus</i>	2	0	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	0	1
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	1	0
<i>Rhacognathus punctatus</i>	0	0	1
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	1	0	0

Merlemont | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0

Modave-Triffoy | 20 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	1	0	1
<i>Aelia acuminata</i>	2	4	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	2	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	5	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	2	11	7
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	0	1	0
<i>Elasmucha grisea</i>	0	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	0	2
<i>Eurydema oleracea</i>	4	1	3
<i>Eurygaster maura</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	4	0
<i>Graphosoma italicum</i>	4	21	1

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Legnotus limbosus</i>	0	2	0
<i>Palomena prasina</i>	3	8	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	7	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	2	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	6	0
<i>Sciocoris cursitans</i>	0	1	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	0	1	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	2	1	0

Mont des Pins | 22 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	2	0	0
<i>Aelia acuminata</i>	1	7	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	3	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	9	30	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	3	10	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	1	0	0
<i>Elasmucha grisea</i>	1	0	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	1	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	2	2	0
<i>Graphosoma italicum</i>	9	21	1
<i>Legnotus limbosus</i>	0	1	0
<i>Legnotus picipes</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	2	6	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	1	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	3	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	1	0
<i>Sciocoris cursitans</i>	1	0	0
<i>Sciocoris homalonotus</i>	0	1	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	0	1	0
<i>Troilus luridus</i>	0	1	0

Montagne Saint-Pierre | 23 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	2	2	0
<i>Aelia acuminata</i>	4	14	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	5	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	5	44	2
<i>Cyphostethus tristriatus</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	25	57	1
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	2	3	0
<i>Elasmotethus minor</i>	0	2	0
<i>Elasmucha grisea</i>	3	8	0
<i>Eurydema oleracea</i>	6	11	3
<i>Eurygaster maura</i>	0	2	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	3	0
<i>Graphosoma italicum</i>	8	30	7
<i>Legnotus limbosus</i>	1	2	0
<i>Nezara viridula</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	11	19	2

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Pentatoma rufipes</i>	3	21	2
<i>Peribalus strictus</i>	9	14	2
<i>Picromerus bidens</i>	0	0	1
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	5	1
<i>Stagonomus venustissimus</i>	0	0	1
<i>Tritomegas sexmaculatus</i>	2	7	0

Méandre de l'Ourthe | 6 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	0	1
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	0	1
<i>Elasmucha grisea</i>	0	0	1
<i>Eurydema ornata</i>	0	0	2
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	0	1

Noüe Marion | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0

Nysdam | 12 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	6	0	0
<i>Aelia acuminata</i>	7	0	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	1	0	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	3	0	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	5	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	6	1	0
<i>Eurydema ornata</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	5	0	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	0	1
<i>Palomena prasina</i>	15	2	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	4	0	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	4	0	1

Ochamps | 14 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	1	0	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	0	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	5	2	0
<i>Elasmucha grisea</i>	2	0	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	2	0
<i>Eurydema oleracea</i>	1	1	0
<i>Eurygaster austriaca</i>	1	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	4	0	1
<i>Eysarcoris aeneus</i>	1	1	0
<i>Neottiglossa pusilla</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	4	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	5	0	0
<i>Peribalus strictus</i>	2	0	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	1	0	0

Orchimont | 12 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Elasmostethus interstinctus</i>	0	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	5	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	2	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	1	7	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	2	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	2	0
<i>Pinthaeus sanguinipes</i>	0	5	0
<i>Rubiconia intermedia</i>	0	1	0
<i>Sehirus luctuosus</i>	0	1	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	0	3	0
<i>Troilus luridus</i>	0	2	0

Ourthe Orientale | 12 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	2	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	6	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Elasmostethus interstinctus</i>	2	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	2	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	0	0
<i>Neottiglossa pusilla</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	1	0

Petit Vivier | 5 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0

Plate Dessous les Monts | 16 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	1	0	0
<i>Aelia acuminata</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	4	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	11	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	0	2	0
<i>Elasmucha grisea</i>	1	0	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	0	1
<i>Eurydema oleracea</i>	0	2	1
<i>Eurydema ornata</i>	1	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	1
<i>Graphosoma italicum</i>	0	2	0
<i>Halyomorpha halys</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	0	2	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	2	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	2	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	1	0

Poncelle | 3 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	0

Pont Napoléon | 8 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	2	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Eurydema ornata</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	5	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	3	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	1	0	0
<i>Troilus luridus</i>	0	0	1

Prairie du Carpu | 15 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	4	1	0
<i>Aelia acuminata</i>	3	1	1
<i>Arma custos</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	0	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Elasmotherus interstinctus</i>	1	0	0
<i>Eurydema dominulus</i>	1	0	0
<i>Eurydema oleracea</i>	1	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	4	1	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	3	1	2
<i>Palomena prasina</i>	5	5	2
<i>Pentatoma rufipes</i>	4	2	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	0	1
<i>Piezodorus lituratus</i>	1	0	1
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	6	0	0
<i>Zicrona caerulea</i>	1	3	0

Pré Morat | 5 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	1	0

Pré Taman | 10 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	2	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	2	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	3	1
<i>Eurydema dominulus</i>	0	4	1
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	2	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	7	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	2	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	0

Pré du Duc | 3 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	1	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	0	1	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	2	0

Pré l'évêque | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	2	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0

Pré à la Peste | 4 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Cyphostethus tristriatus</i>	1	0	0
<i>Elasmucha grisea</i>	1	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	5	0	0

Préelles | 5 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	2	0	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	3	0	0

Prés de Grand Rieu | 3 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	0	1
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0

Prés de Latour | 10 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	2	0
<i>Aelia acuminata</i>	2	1	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	2	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	2	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	3	0	0
<i>Nezara viridula</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	5	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	1	0	0

Prés de Virelles | 3 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	3	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0

Prés de la Geaide | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Piezodorus lituratus</i>	2	0	0

Prés de la Wamme | 7 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	1	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	1	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	1
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	0	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0

Prés du Village | 3 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	1	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	2	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	4	1	0

Rechterbach | 9 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	2	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	3	2	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	3	0
<i>Palomena prasina</i>	1	1	0
<i>Peribalus strictus</i>	5	0	0
<i>Pinthaeus sanguinipes</i>	1	0	0

Ri d’Howisse | 16 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	1	1
<i>Aelia acuminata</i>	0	1	3
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	3	1
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	2	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	6	1
<i>Eurydema dominulus</i>	1	0	1
<i>Eurydema oleracea</i>	1	0	0
<i>Eurydema ornata</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	0	1
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	0	1
<i>Graphosoma italicum</i>	1	2	0
<i>Neottiglossa pusilla</i>	0	0	2

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Palomena viridissima</i>	0	0	2
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	1	1
<i>Peribalus strictus</i>	0	0	1
<i>Picromerus bidens</i>	0	1	0

Roche Madoux | 12 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	1	3
<i>Aelia acuminata</i>	5	3	1
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	2	21	4
<i>Coptosoma scutellatum</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	6	9	3
<i>Eurydema oleracea</i>	0	0	1
<i>Eurygaster testudinaria</i>	2	0	1
<i>Graphosoma italicum</i>	7	4	0
<i>Palomena prasina</i>	2	2	3
<i>Peribalus strictus</i>	0	0	2
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	2	0	0
<i>Troilus luridus</i>	0	0	1

Roda | 17 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	1	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	2	1
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	7	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	4	4
<i>Eurydema dominulus</i>	0	10	2
<i>Eurydema oleracea</i>	0	0	2
<i>Eurydema ornata</i>	0	0	2
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	2	2
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	6	1
<i>Graphosoma italicum</i>	0	3	0
<i>Palomena prasina</i>	0	5	5
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	3	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	2	7
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	0	3
<i>Rhacognathus punctatus</i>	0	2	1
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	2

Rognac | 3 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Elasmucha grisea</i>	0	2	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0

Roly | 10 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	0	1
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	2	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	3	3	0
<i>Palomena prasina</i>	0	3	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	1	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	1	0

Roncine | 3 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	2	0

Ronveaux | 3 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	2	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	4	0	0

Roselière de Neerpede | 7 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	2	0	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	2	0	0
<i>Dyroderes umbraculatus</i>	2	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	2	0	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Eysarcoris aeneus</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	0
<i>Zicrona caerulea</i>	1	0	0

Ru des Fagnes | 9 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Arma custos</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	6	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	0	2	0
<i>Elasmucha grisea</i>	0	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurygaster austriaca</i>	0	3	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Rhacognathus punctatus</i>	0	1	0

Ruisseau de Biran | 5 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	1
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	1
<i>Eurydema oleracea</i>	0	0	1
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	0	1
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0

Ruisseau de Mellier | 5 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	1	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0

Ruisseau de Nantimont | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	2	0

Ruisseau de la Jonquière | 4 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Eurydema oleracea</i>	0	0	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	0	1
<i>Zicrona caerulea</i>	0	0	1

Ruisseau des Ecrevisses | 3 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0

Ry d'Oneux | 4 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Arma custos</i>	0	1	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	1	0

Ry de Bîve | 18 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	1	4	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	11	5	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	8	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	2	1	0
<i>Elasmucha grisea</i>	0	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	1	4	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Eurydema ornata</i>	0	1	1
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	2	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	4	0
<i>Graphosoma italicum</i>	5	0	0
<i>Palomena prasina</i>	3	4	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	1	1
<i>Picromerus bidens</i>	0	1	0
<i>Rhacognathus punctatus</i>	1	0	0
<i>Sehirus luctuosus</i>	0	1	0
<i>Troilus luridus</i>	0	2	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	0

Sablière de Nethen | 15 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	1	0	0
<i>Aelia acuminata</i>	5	0	0
<i>Arma custos</i>	1	0	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	0	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	5	2	1
<i>Eurydema oleracea</i>	5	3	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	2	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	1	0
<i>Palomena prasina</i>	2	3	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	1	0
<i>Peribalus strictus</i>	2	0	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	7	1	0
<i>Podops inuncta</i>	0	0	1
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	1	1	0
<i>Sehirus luctuosus</i>	1	0	0

Sampont | 14 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	1	0
<i>Aelia acuminata</i>	1	1	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	1	1	1
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	2	1
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	3	2
<i>Elasmucha grisea</i>	1	0	0
<i>Eurydema dominulus</i>	1	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	1	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	2	0	1
<i>Graphosoma italicum</i>	1	2	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	0	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	2	1
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	0

Sarts du Crep | 3 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	2	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	3	0
<i>Thyreocoris scarabaeoides</i>	0	1	0

Sclaigneaux | 32 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	4	3	3
<i>Aelia acuminata</i>	16	16	5
<i>Aelia klugii</i>	0	0	1
<i>Arma custos</i>	2	6	3
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	12	2
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	12	59	9
<i>Coptosoma scutellatum</i>	1	13	3
<i>Dolycoris baccarum</i>	30	26	6
<i>Dyroderes umbraculatus</i>	1	0	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	2	7	4
<i>Elasmotethus minor</i>	1	0	0
<i>Elasmucha grisea</i>	17	13	2
<i>Eurydema oleracea</i>	5	7	1
<i>Eurygaster maura</i>	7	3	1
<i>Eurygaster testudinaria</i>	3	12	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	0	1
<i>Graphosoma italicum</i>	5	17	1
<i>Holcogaster fibulata</i>	1	4	0
<i>Legnotus limbosus</i>	2	0	0
<i>Neottiglossa pusilla</i>	1	0	1
<i>Palomena prasina</i>	19	38	10
<i>Palomena viridissima</i>	0	0	3
<i>Pentatoma rufipes</i>	23	25	4
<i>Peribalus strictus</i>	1	11	1
<i>Picromerus bidens</i>	0	3	1
<i>Piezodorus lituratus</i>	19	16	4
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	3	6	3
<i>Sciocoris cursitans</i>	2	5	1
<i>Stagonomus bipunctatus</i>	0	1	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	1	6	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	2	2	0
<i>Tritomegas sexmaculatus</i>	0	1	0

Sol Fagne | 8 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	2	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Elasmucha grisea</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	4	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0

Soulwez | 11 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	1	0	0
<i>Aelia acuminata</i>	6	0	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	3	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	1	0	0
<i>Eurydema oleracea</i>	1	2	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	6	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	4	6	0
<i>Palomena prasina</i>	4	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	0	0
<i>Peribalus strictus</i>	2	0	0

Soëster | 22 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	8	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	6	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	3	34	2
<i>Dolycoris baccarum</i>	2	8	1
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	0	2	0
<i>Elasmucha grisea</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	4	11	1

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Eurydema ornata</i>	0	2	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	2	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	9	2
<i>Neottiglossa leporina</i>	0	1	0
<i>Neottiglossa pusilla</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	1	5	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	12	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	7	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	1	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	6	0
<i>Podops inuncta</i>	0	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	2	0
<i>Sciocoris cursitans</i>	0	2	0
<i>Sehirus luctuosus</i>	1	0	0

Sur Havrenne | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	0

Sébastienopol | 12 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	2	0
<i>Aelia acuminata</i>	1	3	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	2	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	2	8	0
<i>Elasmostethus interstinctus</i>	1	0	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	2	2	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	2	8	0
<i>Palomena prasina</i>	0	2	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	4	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	1	0

Tché Coquet | 5 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	1	0	0

Terril Frederic | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	0	1

Terril du Gosson | 4 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	0	1
<i>Graphosoma italicum</i>	3	2	0
<i>Palomena prasina</i>	1	3	1

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Piezodorus lituratus</i>	1	2	1

Thier aux pourcets | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0

Thier d'Ozo | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0

Thier de Boirs | 10 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	3	0	0
<i>Aelia acuminata</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	2	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	2	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	9	0
<i>Palomena prasina</i>	3	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	3	1	0
<i>Peribalus strictus</i>	1	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	1	0	0
<i>Sciocoris homalonotus</i>	1	0	0

Thier de Coïsse | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	0	0

Thier du Gibet | 6 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	4	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	2	2	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	1	0

Thier à la Tombe | 12 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Adomerus biguttatus</i>	2	0	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	1	0	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	3	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	3	0	2
<i>Eurydema oleracea</i>	4	0	1
<i>Eurygaster maura</i>	3	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Geotomus petiti</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	2	9	4
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	1	0	1
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	0	2

Thieu | 9 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	2	3	0
<i>Dyroderes umbraculatus</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	2	3	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	2	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	2	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	0	1	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	0

Thommen | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0

Tibautienne | 7 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	2	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	2	0
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	1	0

Tienne de Dion | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0

Tienne du Grand Sart | 4 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	2	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	5	0

Tiènes de Dailly | 21 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	7	10	1
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	3	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	9	2
<i>Cydnus aterrimus</i>	0	1	0
<i>Cyphostethus tristriatus</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	12	3
<i>Eurydema dominulus</i>	1	2	0
<i>Eurydema oleracea</i>	6	7	0
<i>Eurygaster austriaca</i>	0	2	0
<i>Eurygaster maura</i>	0	0	1
<i>Eurygaster testudinaria</i>	8	5	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	7	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	11	3
<i>Neottiglossa pusilla</i>	6	0	0
<i>Palomena prasina</i>	4	9	0
<i>Peribalus strictus</i>	2	3	1
<i>Picromerus bidens</i>	0	1	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	1	0
<i>Podops inuncta</i>	8	0	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Sciocoris cursitans</i>	0	1	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	1	0	0

Tournailles | 7 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	2	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	1	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	3	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	0	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0

Trixhe Nollet | 3 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	2	0
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0

Val de Coeurcq | 16 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	2	2	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	2	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	4	12	0
<i>Dyroderes umbraculatus</i>	1	0	0
<i>Eurydema oleracea</i>	3	12	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	1	0	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Graphosoma italicum</i>	10	11	0
<i>Palomena prasina</i>	2	2	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	3	0
<i>Peribalus strictus</i>	1	0	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	5	4	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	2	3	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	1	0	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	1	0	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	0

Vallon du Wayot | 7 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	2	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	7	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	3	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	18	0
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0

Vallée de l'Almache | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	1	0	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	1	0

Vallée de l'Eau d'Yves | 22 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	0	1
<i>Aelia acuminata</i>	2	2	1
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	2	1
<i>Coptosoma scutellatum</i>	0	0	1
<i>Dolycoris baccarum</i>	2	5	1
<i>Elasmostethus interstinctus</i>	0	0	1
<i>Elasmucha grisea</i>	0	0	1
<i>Eurydema dominulus</i>	0	3	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	6	1
<i>Eurygaster maura</i>	0	0	1
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	1
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	0	1
<i>Graphosoma italicum</i>	2	6	1
<i>Palomena prasina</i>	0	5	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	0	1
<i>Peribalus strictus</i>	1	1	0
<i>Picromerus bidens</i>	1	0	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	0	1
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	1	0
<i>Sehirus luctuosus</i>	0	0	1
<i>Stagonomus venustissimus</i>	0	0	1
<i>Tritomegas bicolor</i>	0	0	1

Vallée de l’Hermeton | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	2	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	7	0

Vallée de la Bacquelaine | 6 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	2	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	1	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	0	1	0

Vallée de la Bellemeuse et du Mincée | 6 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	2	0	0
<i>Elasmostethus interstinctus</i>	0	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	2	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	1	0

Vallée de la Gueule | 13 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	2	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	2	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	2	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	2	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	3	0
<i>Palomena prasina</i>	0	5	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	2	0	0
<i>Peribalus strictus</i>	3	1	0
<i>Picromerus bidens</i>	2	0	1
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	1	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	2	0	0

Vallée de la Gulp | 16 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	3	0	0
<i>Arma custos</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	3	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	5	2	0
<i>Elasmostethus interstinctus</i>	0	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	2	0
<i>Eurydema oleracea</i>	1	3	0
<i>Eurydema ornata</i>	2	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	2	3	0
<i>Graphosoma italicum</i>	5	15	0
<i>Legnotus limbosus</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	3	0	0
<i>Peribalus strictus</i>	1	0	1
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	1	1	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Tritomegas bicolor</i>	1	1	0

Vallée de la Houille | 18 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	2	2	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	4	1
<i>Eurydema dominulus</i>	0	4	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	2	1
<i>Eurydema ornata</i>	0	0	1
<i>Eurygaster austriaca</i>	0	2	0
<i>Eurygaster maura</i>	0	0	1
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	5	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	3	0
<i>Graphosoma italicum</i>	3	3	0
<i>Neottiglossa pusilla</i>	0	2	0
<i>Palomena prasina</i>	3	1	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	3	0	1
<i>Peribalus strictus</i>	1	0	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	0	2
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	1	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	1	0	0

Vallée de la Houillette | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0

Vallée de la Hulle | 21 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	1	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	12	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	11	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	4	1
<i>Elasmostethus interstinctus</i>	0	4	1
<i>Elasmucha grisea</i>	0	7	0
<i>Eurydema oleracea</i>	1	0	0
<i>Eurydema ornata</i>	0	0	2
<i>Eurygaster austriaca</i>	0	1	0
<i>Eurygaster maura</i>	0	1	3
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	10	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	4	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	2	0
<i>Legnotus limbosus</i>	1	0	0
<i>Neottiglossa pusilla</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	4	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	1	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	2	1
<i>Zicrona caerulea</i>	0	2	0

Vallée de la Rulles | 4 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	0	1

Vallée de la Vierre | 14 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	1	0	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	1	0	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	5	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	2	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	4	1	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	1	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	6	5	0
<i>Neottiglossa pusilla</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	2	1	0
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	1	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	0	0	1
<i>Zicrona caerulea</i>	0	0	1

Vallée de la Warche | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Graphosoma italicum</i>	1	0	0

Vallée de la Wimbe | 15 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	1	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	1	6	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	4	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	3	1
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurydema ornata</i>	1	0	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	5	2
<i>Legnotus limbosus</i>	0	1	1
<i>Palomena prasina</i>	1	5	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	4	1
<i>Peribalus strictus</i>	0	4	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	0	1
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	0	1	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	0	0	1

Vallée des Aleines | 5 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	0

Vallée des Hayons | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	0

Vellereux | 4 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Eurydema dominulus</i>	0	2	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	2	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	1	0

Verger d'Ambly | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Graphosoma italicum</i>	1	0	0

Vieille Rochette | 12 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	3	0	0
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	2	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	2	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	1	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	1	0	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	2	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	2	0	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	0	1
<i>Piezodorus lituratus</i>	2	1	0

Viesville | 14 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	1	0	0
<i>Aelia acuminata</i>	1	0	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Coptosoma scutellatum</i>	0	2	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	1	2	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	3	0	0
<i>Elasmucha grisea</i>	2	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	2	5	0
<i>Palomena prasina</i>	5	2	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	5	2	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	0	2	0
<i>Pinthaeus sanguinipes</i>	1	0	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	1	1	0

Virelles | 29 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	2	4	0
<i>Aelia acuminata</i>	4	7	0
<i>Arma custos</i>	0	1	1
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	4	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	1	7	1
<i>Coptosoma scutellatum</i>	0	2	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	5	15	2

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	0	5	1
<i>Elasmotethus minor</i>	0	0	1
<i>Elasmucha grisea</i>	0	1	1
<i>Eurydema dominulus</i>	0	7	3
<i>Eurydema oleracea</i>	2	3	2
<i>Eurydema ornata</i>	0	1	0
<i>Eurygaster maura</i>	0	2	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	8	4
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	4	2
<i>Graphosoma italicum</i>	21	29	0
<i>Legnotus limbosus</i>	1	1	0
<i>Palomena prasina</i>	14	20	7
<i>Pentatoma rufipes</i>	7	10	1
<i>Peribalus strictus</i>	2	5	3
<i>Picromerus bidens</i>	1	1	1
<i>Pinthaeus sanguinipes</i>	0	0	3
<i>Rhacognathus punctatus</i>	0	1	0
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	6	12	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	1	0	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	0	3	0
<i>Troilus luridus</i>	0	1	1
<i>Zicrona caerulea</i>	1	1	0

Vis Prés | 19 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	1	1

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	3	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	12	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	9	0
<i>Elasmotethus interstinctus</i>	0	1	0
<i>Elasmucha grisea</i>	1	2	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Eysarcoris aeneus</i>	0	4	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	0	0
<i>Legnotus limbosus</i>	0	1	0
<i>Legnotus picipes</i>	0	2	0
<i>Palomena prasina</i>	1	8	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	0	1
<i>Peribalus strictus</i>	0	5	0
<i>Piezodorus lituratus</i>	1	9	1
<i>Rubiconia intermedia</i>	0	1	0
<i>Tritomegas bicolor</i>	0	1	0
<i>Troilus luridus</i>	0	2	0
<i>Zicrona caerulea</i>	0	3	1

Vivi des Bois | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Graphosoma italicum</i>	0	2	0

Vodelée | 11 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	0	1

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	3	1
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	3
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Eurygaster maura</i>	0	0	1
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	3	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	0	1

Wancennes | 4 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	1	0	0
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	2	0

Warchenne | 8 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Palomena prasina</i>	0	1	0
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	1	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Peribalus strictus</i>	0	1	0
<i>Picromerus bidens</i>	0	1	0

Waremmme | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	0	0	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	0	0	2

Waulsort | 9 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Aelia acuminata</i>	0	2	0
<i>Coptosoma scutellatum</i>	1	0	0
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	2	0
<i>Eurydema oleracea</i>	1	0	0
<i>Graphosoma italicum</i>	0	1	0
<i>Legnotus limbosus</i>	1	0	0
<i>Palomena prasina</i>	1	0	1
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	1	1	0
<i>Stagonomus venustissimus</i>	0	1	0

Wiers | 5 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	1	0
<i>Eurydema dominulus</i>	0	1	0
<i>Eurydema oleracea</i>	0	1	0
<i>Eurygaster testudinaria</i>	1	0	0

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Graphosoma italicum</i>	0	2	0

Wilbrote | 1 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0

Wyompont | 2 espèces

Espèces observées	Période des inventaires (2022 et 2023)	Entre 2015 et 2021	Avant 2015
<i>Dolycoris baccarum</i>	0	1	0
<i>Graphosoma italicum</i>	1	0	0

REMERCIEMENTS

Nous tenions tout particulièrement à remercier Stéphane Claerebout pour son aide dans le lancement de cet saison d'inventaires dans les réserves. Ses remarques sur nos premiers documents, ainsi que le temps qu'il nous a consacré pour organiser une première sortie de formation aux techniques de recherche sur ce groupe taxonomique, nous ont été très précieux !

Un grand merci également à notre stagiaire Axelle Charlier qui nous a bien aidé pour la rédaction des textes des fiches espèces.

Nous remercions également les validateurs de ce groupe sur observations.be : Stéphane Claerebout, Manuel Valdueza et Koen Lock, qui ont accompli un travail de validation considérable, toujours avec une rapidité remarquable.

La majorité des photographies utilisées dans ce rapport sont sous licence Creative Commons. Nous remercions chaleureusement les photographes qui en autorisent l'usage.

Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à tous les volontaires ayant participé à ces inventaires, sans qui ces rapports auraient été bien moins riches et intéressants.

BIBLIOGRAPHIE

Aukema, B. & D.J. Hermes, 2020. Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel V: Pentatomorpha II (Coreoidea en Pentatomoidae). EIS, Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.

Charlot M-A. et Claerebout S., (2016). Clé de détermination photographique des « punaises des bois » ou pentatomoïdes de Belgique. Cercles des Naturalistes de Belgique Asbl. 112 p.

Livory (A.), 2011. – Liste commentée des Pentatomoidea de la Manche - Première partie. L'Argiope, 73 : 3-36. Livory (A.), 2012. – Liste commentée des Pentatomoidea de la Manche - Deuxième partie : les Pentatominae. L'Argiope, 76-77 : 28-62.

Lupoli Roland & Dusoulie François, 2015. - Les Punaises Pentatomoidea de France. Editions Ancyrosoma, Fontenay-les-Vervains-Bois. 429 p.

Miquet (A.), 2019. – « Punaises » de Savoie - Etat des connaissances en 2019 - Familles des Pentatomidae, Scutelleridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Thyreocoridae, Plataspidae). Conservatoire d'espaces naturels de Savoie, Le Bourget-du-Lac, 89 p.

